



## 26. cvičení – lineární ODR

<https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~kuncova/vyuka.php>, kuncova@karlin.mff.cuni.cz

### Teorie

**Definice 1.** *Lineární diferenciální rovnici prvního řádu* rozumíme rovnici tvaru

$$y' + p(x)y = q(x), \quad (1)$$

kde  $p, q$  jsou funkce na daném intervalu  $(a, b)$ .

V dalším budeme předpokládat, že  $p, q$  jsou spojité funkce. Pak každé řešení rovnice (1) je třídy  $\mathcal{C}^1$ .

*Homogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu* budeme rozumět rovnici tvaru

$$y' + p(x)y = 0.$$

**Věta 2.** Maximální řešení rovnice (1) splňující podmínku  $y(x_0) = y_0$ , kde  $x_0 \in (a, b)$ ,  $y_0 \in \mathbb{R}$ , má tvar

$$y(x) = \left( \int_{x_0}^x q(t)e^{P(t)} dt \right) e^{-P(x)} + y_0 e^{-P(x)}, \quad x \in (a, b),$$

kde  $P$  je primitivní funkce k  $p$  na  $(a, b)$  splňující  $P(x_0) = 0$ .

### Algoritmus pro lineární ODR

1. Uvažujeme interval  $(a, b)$ , na kterém dále pracujeme, a upravíme rovnici na lineární.
2. Najdeme řešení  $y_H$  homogenní rovnice pomocí separace proměnných, nezapomeneme na konstantu. (Vyjde  $e^{P(x)+c}$ , kde  $P(x) = \int p(x) dx$ .)
3. Přepíšeme  $c$  na  $c(x)$  - odeť je to funkce. Dosadíme do původní rovnice s pravou stranou.
4. Hodně se toho pokrátí, ze zbytku vyjádříme  $c'(x)$  a spočteme  $c(x)$ . Tím najdeme  $y_P$ .
5.  $y = y_H + y_P$  (Nebo prostě dosadíme za vyšlou konstantu.)
6. Je-li nutno, nalepíme - to se stává jen v případě, že původní rovnici bylo třeba upravit.
7. Případně aplikujeme podmínky.

**Poznámka 3** (Bernoulliho rovnice). Rovnici  $y' = a(x)y + b(x)y^\alpha$  lze převést na lineární rovnici pomocí substituce  $z = y^{1-\alpha}$ .

## Příklady

1. Najděte řešení diferenciálních rovnic

(a)  $y' + y = e^x$

(b)  $\ast\ast xy' - y = x^2$

(c)  $y' - xy = e^{\frac{x(x+2)}{2}}$

(d)  $\clubsuit y' \operatorname{tg} x - y = 1$

(e)  $y' = -\frac{3}{x}y + \frac{2}{x^3}, y(1) = 3$

(f)  $y' = y + e^x, y(2) = -3$

(g)  $y' - \frac{3x^2y}{1+x^3} = 1 + x^3, y(1) = -1$

(h)  $\heartsuit xy' + (x+1)y = 3x^2e^{-x}$

## Zkouškové příklady

2. Najděte řešení diferenciálních rovnic

(a)  $y' + \frac{y}{x} = e^{x^2}$

(b)  $y' - y \ln x = x^{x+1}$

(c)  $\clubsuit xy' - 2y = 2x^4$

(d)  $y' + 3x^2y = e^{-x^3+x} \sin x$

(e)  $y'(1+x^2) + \frac{y}{\arctan x} = x^2(1+x^2)$

(f)  $y' + \frac{xy}{1+x^2} = 1$

## Bernoulliho rovnice

3. Najděte řešení diferenciálních rovnic

(a)  $y' - xy = -y^3e^{-x^2}$

(b)  $xy^2y' = x^2 + y^3$

(c)  $y' + 2xy = 2xy^3$