

$$\textcircled{1} \quad g(u, v) = \sin(u \cdot v) \quad , \quad \text{ kde } \quad u = xy$$

$$v = x - y$$

$$h(u(x, y), v(x, y)) = \sin(u(x, y) \cdot v(x, y))$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial h}{\partial x} &= \frac{\partial g}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= \cos(uv) \cdot v \cdot y + \cos(uv) \cdot u \cdot 1 \\ &= \cos(xy(x-y)) \cdot (x-y)y + \cos(xy(x-y)) \cdot xy \end{aligned}$$

Shrnemej s:

$$\frac{\partial \sin(xy(x-y))}{\partial x} = \cos(xy(x-y)) \cdot (y(x-y) + xy)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial h}{\partial y} &= \frac{\partial g}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\ &= \cos(uv) \cdot v \cdot x + \cos(uv) \cdot u \cdot (-1) \\ &= \cos(xy(x-y)) \cdot (x-y) \cdot x + \cos(xy(x-y)) \cdot xy \cdot (-1) \end{aligned}$$

Shrnemej s

$$\frac{\partial \sin(xy(x-y))}{\partial y} = \cos(xy(x-y)) \cdot (x(x-y) + xy(-1))$$

(2) Necht $F = (F_1, F_2): \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ je zobrazení definované

$$F(x, y) = (e^{x+y} \sin(x+y), \arctan(x^2+y)),$$

Zobrazení $G = (G_1, G_2): \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ splňuje $G(0,0) = (0,0)$

a v $(0,0)$ derivaci repr. maticí

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$$

(a) ukážete, že v bodě $(0,0)$ $\exists$ der. $F \circ G$ a spočítejte její repr. maticí

(b) Spočítejte der. fce $u \mapsto G_1(\sin u, u)$ v bodě 0.

(a) ∂F :

$$\frac{\partial F_1}{\partial x} = e^{x+y} \sin(x+y) + e^{x+y} \cos(x+y), \quad \frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{1}{1}$$

$$\frac{\partial F_2}{\partial x} = \frac{1}{1+(x^2+y)^2} \cdot 2x$$

$$\frac{\partial F_2}{\partial y} = \frac{1}{1+(x^2+y)^2}$$

v $(0,0)$ máme

$$\begin{pmatrix} 0+1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

* proto der. fce spojitě, der. $\exists$.

$F \circ G$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$$

der. složeni také $\exists$ (velik)

(b) $\frac{\partial G_1}{\partial x}(0,0) = 3 \quad \frac{\partial G_1}{\partial y}(0,0) = 2$

$$h(u) = G_1(\sin u, u) = G_1(x, y), \text{ kde } x = \sin u, y = u$$

$$\frac{dh}{du} = \frac{\partial G_1}{\partial x} \cdot \frac{dx}{du} + \frac{\partial G_1}{\partial y} \cdot \frac{dy}{du} = \frac{\partial G_1}{\partial x} \cdot \cos u + \frac{\partial G_1}{\partial y} \cdot 1$$

Pro bod $u=0 \rightarrow G_1(0) \text{ máme}$

$$\frac{dh}{du}(0) = 3 \cdot \cos 0 + 2 \cdot 1 = \underline{\underline{5}}$$