



## 2. cvičení - Posloupnosti funkcí 2

<https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~kuncova/vyuka.php>, kuncova@karlin.mff.cuni.cz

### Teorie

**Věta 1** (Charakterizace stejnoměrné konvergence). Nechť  $M \subset \mathbb{R}$  je interval a  $f, f_n : M \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , jsou funkce. Pak

$$f_n \rightrightarrows f$$

právě tehdy, když

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup\{|f_n(x) - f(x)| : x \in M\} = 0.$$

**Věta 2** (Stejnoměrná konvergence a spojitost.). Nechť  $M \subset \mathbb{R}$  je interval a  $f, f_n : M \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , kde  $f_n$  jsou **spojité** funkce. Nechť navíc  $f_n \xrightarrow{\text{loc}} f$  na  $M$ . Pak  $f$  je také **spojitá** na  $M$ .

**Věta 3** (Charakterizace lokálně stejnoměrné konvergence na intervalu.). Nechť  $(a, b) \subset \mathbb{R}$  je interval (i neomezený) a  $f_n : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , jsou funkce. Pak  $\{f_n\}$  konverguje lokálně stejnoměrně na  $(a, b)$  právě tehdy, když  $\{f_n\}$  konverguje stejnoměrně na každém intervalu  $[c, d] \subset (a, b)$ .

**Věta 4** (Moore-Osgood). Nechť  $(a, b) \subset \mathbb{R}$  je interval a  $f, f_n : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , jsou funkce. Nechť navíc

1.  $\exists r > 0: f_n \rightrightarrows f$  na  $B(x_0, r) \setminus \{x_0\}$ ,
2.  $\forall n \in \mathbb{N} \exists a_n: \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = a_n$ .

Pak existují vlastní limity  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  a  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  a jsou si rovny.

### Algoritmus

1. Určíme **bodovou** limitu. Určíme i **interval**  $I$ , kde posloupnost konverguje.
2. Vyšetříme, zda posloupnost **stejnoměrně konverguje** na celém  $I$ .
  - (a) Zkusíme **supremový test** na stejnoměrnou konvergenci (na celém  $I$ ).
  - (b) Zkusíme konvergenci **vyvrátit**.
    - i. Nespojitá  $f$ .
    - ii. Moore-Osgood.
3. Pakliže funkce **nekonverguje** na celém  $I$ :
  - (a) Identifikujeme **problematické body**. Zafixujeme interval  $[a, b]$  tak, aby obsahoval problematické body, a zkusíme **vyvrátit** konvergenci.
  - (b) Zkusíme určit **lokálně stejnoměrnou konvergenci**. Zafixujeme interval  $[a, b]$ , který **neobsahuje** probl. body a **vyšetříme konvergenci**.
4. Napíšeme **závěr**.

## Příklady

<https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~pick/analyza.pdf>  
<https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~bouchala/Vyuka/MFF-NMMA201-1819/Cv08%20-%20Stejnom%C4%9brn%C3%A1%20konvergencie%20II%20-%20posloupnosti%20funkc%C3%AD%20ad%202.pdf>

1. Vyšetřete konvergenci funkcí – najděte **bodovou** limitu, vyšetřete **stejnoměrnou** a **lokálně** stejnoměrnou konvergenci. Není-li řečeno jinak, vyšetřujte na  $\mathbb{R}$ .

(a) $f_n(x) = e^{n(x-1)}$ na $(0, 1)$	(e) $\heartsuit f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}}$
(b) $\clubsuit f_n(x) = \frac{nx}{1+n+x}$ na $(0, \infty)$	(f) $\clubsuit f_n(x) = n \left( \sqrt{x + \frac{1}{n}} - \sqrt{x} \right)$ na $(0, \infty)$
(c) $\clubsuit f_n(x) = \frac{\log(nx)}{n}$ na $(0, \infty)$	(g) $f_n(x) = \sqrt{x} n^{-\sqrt{x}} \log n$ na $[0, \infty)$
(d) $f_n(x) = \frac{x}{n} \log \frac{x}{n}$ na $(0, \infty)$	(h) $\clubsuit f_n(x) = \sqrt[n]{x^n + 3^n}$ na $[0, \infty)$

## Zkouškové příklady

2. Vyšetřete konvergenci funkcí – najděte **bodovou** limitu, vyšetřete **stejnoměrnou** a **lokálně** stejnoměrnou konvergenci. Není-li řečeno jinak, vyšetřujte na  $\mathbb{R}$ .

(a) $f_n(x) = n \arctan \frac{x}{n}$	(d) $f_n(x) = e^{\frac{ x -n}{ x +n}} + e^{-\frac{ x -n}{ x +n}}$
(b) $f_n(x) = \left  \cos \frac{x}{n} \right ^n$	(e) $f_n(x) = \frac{e^{\frac{\sqrt{x}}{n}} - 1}{\tan(\frac{1}{n})}, [0, \infty)$
(c) $f_n(x) = \frac{x+n}{\sqrt{x^2+n^2}}$	(f) $f_n(x) = \frac{\log(1 + \frac{x^2}{\sqrt{n}})}{\sqrt{n+3} - \sqrt{n}}$

## Bonus

**Věta 5.** Nechť  $(a, b)$  je **omezený** interval,  $f_n : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ . Nechť

- (a)  $f_n$  mají vlastní derivaci na  $(a, b)$ ,
- (b) existuje  $x_0 \in (a, b)$  takové, že  $\{f_n(x_0)\}$  konverguje,
- (c)  $\{f'_n\}$  konverguje stejnoměrně na  $(a, b)$ .

Pak existuje funkce  $f$  taková, že  $f_n \rightrightarrows f$  na  $(a, b)$ ,  $f$  má vlastní derivaci na  $(a, b)$  a platí  $f'_n \rightrightarrows f'$  na  $(a, b)$ .

3. Nechť  $f_n = \frac{1}{n} \arctan(x^n)$  na  $(0, \infty)$ . Ukažte, že  $f_n$  konverguje stejnoměrně k jisté  $f$ , ale není pravda, že  $f'_n \rightrightarrows f'$ .
4. Nechť  $f_n = \sin \frac{x}{n^2}$ . Najděte bodovou limitu, ověřte (lokálně) stejnoměrnou konvergenci. Najděte derivace a ověřte předpoklady Věty o derivacích. Ukažte, že závěry věty platí.

**Věta 6.** Nechť  $(a, b)$  je **omezený** interval,  $f_n \rightrightarrows f$  na  $[a, b]$  a  $f_n \in \mathcal{C}([a, b])$ . Pak

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n = \int_a^b f.$$

5. Nechť  $f_n$  je definována takto:  $f_n(0) = \frac{1}{n}$ , mimo interval  $[-n, n]$  je konstantně nulová a na intervalu  $[-n, n]$  je dodefinována lineárně. Načrtněte první 3 funkce (vyjdou takové špičaté kopečky). Ověřte, zda  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_n = \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$  nebo ne. Pak ověřte předpoklady věty nebo najděte předpoklad, který není splněný.

(1b) na $[a, b]$ je $\frac{1+x}{x^2+x} > \frac{b}{b+a}$	(1c) logaritmické býti záporný)	(1e) $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$ , pak odhady
(1f) $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$ , pak odhady	(1h) 2 polickati, rozdělte na intervaly $[0, 3], [3, \infty)$	