



## 8. cvičení – Implicitní funkce

<https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~kuncova/vyuka.php>, kuncova@karlin.mff.cuni.cz

### Teorie

**Věta 1.** Necht  $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ ,  $G \subset \mathbb{R}^{n+1}$  je otevřená množina,  $F : G \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ ,  $\bar{y} \in \mathbb{R}$ ,  $[\bar{x}, \bar{y}] \in G$  a necht platí:

1.  $F \in \mathcal{C}^k(G)$
2.  $F(\bar{x}, \bar{y}) = 0$
3.  $\frac{\partial F}{\partial y}(\bar{x}, \bar{y}) \neq 0$ .

Pak existuje okolí  $U \subset \mathbb{R}^n$  bodu  $\bar{x}$  a okolí  $V \subset \mathbb{R}$  bodu  $\bar{y}$  tak, že  $U \times V \subset G$  a pro každé  $x \in U$  existuje právě jedno  $y \in V$  s vlastností  $F(x, y) = 0$ . Píšeme-li  $y = \varphi(x)$ , pak  $\varphi \in \mathcal{C}^k(U)$  a

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x_j}(x, \varphi(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x))}$$

kde  $j \in \{1, \dots, n\}$ ,  $x \in U$ .

### Příklady

1. Ukažte, že rovnice  $x^2 + xy^2 - y^2 = 1$  určuje na okolí bodu  $[-2, 1]$  implicitně zadanou funkci  $y(x)$ . Spočtete první derivaci této funkce v bodě  $-2$ .
2. Ukažte, že rovnice  $x^2 + y^2 + xy - 3 = 0$  určuje na okolí bodu  $[1, 1]$  implicitně zadanou funkci  $y(x)$ . Spočtete první a druhou derivaci této funkce v bodě  $1$ .
3. Ukažte, že rovnice  $(x^2 + y^2)^2 - 3x^2y - y^3 = 0$  určuje na okolí bodu  $[0, 1]$  implicitně zadanou funkci  $y(x)$ . Spočtete první a druhou derivaci této funkce v bodě  $0$ .
4. Ukažte, že rovnice  $y - \frac{1}{2} \sin y = x$  určuje na okolí bodu  $[\pi, \pi]$  implicitně zadanou funkci  $y(x)$ . Najděte rovnici tečny v bodě  $[\pi, \pi]$ .
5. Ukažte, že rovnice  $y - \frac{1}{2} \sin y = x$  určuje na okolí bodu  $[\frac{\pi-1}{2}, \frac{\pi}{2}]$  implicitně zadanou funkci  $y(x)$ . Určete, zda graf této funkce leží na okolí daného bodu pod tečnou nebo nad tečnou.
6. K rovnici  $-x^2 + y^2 - 2xy + y = 0$  najděte body, v nichž jsou splněny předpoklady věty o implicitní funkci a které jsou stacionárními body takto implicitně definovaných funkcí jedné proměnné. Rozhodněte, zda jsou v těchto bodech lok. extrém.
7. Ukažte, že rovnice  $\ln(x^2z^3) = e^{z \cos y} - 1$  určuje na okolí bodu  $[-1, \frac{\pi}{2}, 1]$  implicitně zadanou funkci  $z(x, y)$ . Vypočtete její parciální derivace 1. řádu a určete jejich hodnotu v daném bodě.
8. Ukažte, že rovnice  $z + e^z = xy + 2$  určuje na okolí bodu  $[-1, 1, 0]$  implicitně zadanou funkci  $z(x, y)$ . Vypočtete její parciální derivace 1. a 2. řádu v daném bodě.
9. Ukažte, že rovnice  $x^2 + y^2 + z^2 + xyz = 20$  určuje na okolí bodu  $[1, 2, 3]$  implicitně zadanou funkci  $z(x, y)$ . Najděte rovnici tečné roviny v daném bodě.

### Zkouškové příklady

10. Ukažte, že daná rovnice určuje na okolí bodu  $[\bar{x}, \bar{y}]$  implicitně zadanou funkci (proměnné  $x$ ). Spočtěte první a druhou derivaci této funkce v bodě  $\bar{x}$ .
- (a)  $x^y + y^x = 2y, [\bar{x}, \bar{y}] = [1, 1]$
  - (b)  $e^{\sin x^2} + e^{\sin xy} = 2y + 2, [\bar{x}, \bar{y}] = [0, 0]$
  - (c)  $\pi/2 + \arcsin(x + y^2) = \arccos(y + x^2), [\bar{x}, \bar{y}] = [0, 0]$
  - (d)  $\arctan(y^2 + xy) = e^{xy} - \cos x + y, [\bar{x}, \bar{y}] = [0, 0]$

### Teorie

11. Rozhodněte, zda je podmínka  $\frac{\partial F}{\partial y}(\bar{x}, \bar{y}) \neq 0$  ve větě o implicitní funkci nutná. Dokážete sestrojít funkci (alespoň obrázkem), u níž platí všechny předpoklady až na tento, a přesto platí závěr?
12. Sestrojte funkci  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , která je parciálně spojitá, ale není spojitá. Řekneme, že  $f$  je parciálně spojitá, pokud pro každé  $x_0 \in \mathbb{R}$  je funkce  $g(y) = f(x_0, y)$  spojitá na  $\mathbb{R}$  (jakožto funkce 1 proměnné), a pro každé  $y_0 \in \mathbb{R}$  je funkce  $h(x) = f(x, y_0)$  spojitá na  $\mathbb{R}$ .
13. Sestrojte funkci  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , která má v bodě  $[0, 0]$  derivaci ve všech směrech  $D_v f(0, 0)$ , ale není v bodě  $[0, 0]$  spojitá.
14. Sestrojte funkci  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , která má v bodě  $[0, 0]$  derivaci ve všech směrech  $D_v f(0, 0)$ , ale neexistuje totální diferenciál  $Df([0, 0])$ .

$$\begin{aligned} 0 &= (0'0)f'_{\frac{y^2+x^2}{\sqrt{y^2+x^2}}} & (71) \\ 0 &= (0'0)f'_{\frac{y^2+x^2}{\sqrt{y^2+x^2}}} & (81) \\ 0 &= (0'0)f'_{\frac{y^2+x^2}{\sqrt{y^2+x^2}}} & (91) \end{aligned}$$