

## I. BANACHOVY ALGEBRY

### 1.1. Pojem Banachovy algebry s jednotkou a grupa invertibilních prvků.

**Definice.** **Banachovou algebrou** rozumíme komplexní algebru  $A$ , na níž je definovaná úplná norma splňující  $\|x \cdot y\| \leq \|x\| \cdot \|y\|$  pro všechna  $x, y \in A$ .

**Poznámka.** Pokud Banachova algebra  $A$  nemá jednotku, lze k ní jednotku přidat. Přesněji, pak existuje Banachova algebra  $B$  s jednotkou a její podalgebra kodimenze jedna, která je izometricky izomorfní s  $A$  (izomorfismus uvažujeme ve smyslu algeber, zachovává tedy i násobení). Dále budeme uvažovat pouze Banachovy algebry s jednotkou (nebude-li řečeno jinak).

**Tvrzení 1** (další vlastnosti Banachových algeber). *Nechť  $(A, \|\cdot\|)$  je Banachova algebra s jednotkou  $e$ . Pak platí*

- $x \cdot 0 = 0 \cdot x = 0$ .
- $A = \{0\}$ , právě když  $e = 0$ .
- Jednotka je určena jednoznačně a  $\|e\| \geq 1$ , je-li  $A$  netriviální (různá od  $\{0\}$ ).
- Je-li  $A$  netriviální, existuje ekvivalentní norma  $\|\cdot\|_1$  na  $A$  tak, že  $(A, \|\cdot\|_1)$  je Banachova algebra a  $\|e\|_1 = 1$ .

**Poznámka.** Bez újmy na obecnosti dále předpokládáme, že  $A$  netriviální Banachova algebra s jednotkou  $e$ , pro kterou platí  $\|e\| = 1$ .

**Definice.** Nechť  $A$  je Banachova algebra.

- Prvek  $x \in A$  se nazývá **invertibilní**, jestliže existuje  $y \in A$  splňující  $xy = yx = e$ .
- Množinu všech invertibilních prvků  $A$  značíme  $G(A)$ .

**Poznámka.** Nechť  $A$  je Banachova algebra a  $x \in A$ . Pokud  $y \in A$  splňuje  $xy = e$ , nazýváme jej **pravou inverzí** prvku  $x$ ; splňuje-li  $yx = e$ , nazýváme jej **levou inverzí**. Prvek  $x$  může mít více různých pravých inverzí, stejně tak může mít více různých levých inverzí. Pokud však má pravou inverzi i levou inverzi, pak je invertibilní. Jeho inverzní prvek je jednoznačně určen a je zároveň jedinou pravou inverzí a jedinou levou inverzí.

**Tvrzení 2** (o násobení invertibilních prvků). *Nechť  $A$  je Banachova algebra.*

- $G(A)$  s operací násobení je grupa.
- Pokud  $x_1, \dots, x_n$  komutují (po dvou), pak  $x_1 \cdots x_n \in G(A)$ , právě když  $\{x_1, \dots, x_n\} \subset G(A)$ .

**Lemma 3** ("Neumannova geometrická řada"). *Nechť  $(A, \|\cdot\|)$  je Banachova algebra s jednotkou  $e$ .*

- Je-li  $\|x\| < 1$  pro  $x \in A$ , platí  $(e - x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$  (řada konverguje absolutně) a  $\|(e - x)^{-1} - e\| \leq \frac{\|x\|}{1 - \|x\|}$ .
- Je-li  $x \in G(A)$ ,  $h \in A$  a  $\|h\| < \frac{1}{\|x^{-1}\|}$ , je

$$\|(x + h)^{-1} - x^{-1}\| \leq \frac{\|x^{-1}\|^2 \|h\|}{1 - \|x^{-1}\| \|h\|}.$$

**Věta 4** (topologické vlastnosti grupy invertibilních prvků). *Nechť  $A$  je Banachova algebra s jednotkou. Pak*

- $G(A)$  je otevřená podmnožina  $A$ ,
- zobrazení  $x \mapsto x^{-1}$  je homeomorfismus  $G(A)$  na sebe,
- je-li  $x_n \in G(A) \rightarrow x \notin G(A)$ , pak  $\|x_n^{-1}\| \rightarrow \infty$ .