

Příklady na 3. týden

Křivkový integrál

Spočtěte následující křivkové integrály

1. $\int_C x^2 ds$, kde C je oblouk AB křivky $y = \ln x$, $A = (2, \ln 2)$, $B = (1, 0)$.
2. $\int_C (x^{\frac{4}{3}} + y^{\frac{4}{3}}) ds$, kde C je asteroida $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$.
3. $\int_C |y| ds$, kde C je lemniskáta $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$.
4. $\int_C (x^2 + y^2) dx + (x^2 - y^2) dy$, kde C je obvod trojúhelníka ABC , $A = (0, 0)$, $B = (1, 0)$, $C = (0, 1)$, přičemž (A, B, C) je trojice uspořádaná ve smyslu orientace křivky.
5. $\int_C \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$, kde C je kružnice $x^2 + y^2 = a^2$, přičemž trojice bodů $A = (a, 0)$, $B = (0, a)$, $C = (-a, 0)$ je uspořádaná ve smyslu orientace křivky.
6. $\int_C y dx + z dy + x dz$, kde C je průsečnice ploch $z = xy$, $x^2 + y^2 = 1$ a trojice bodů $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, 1, 0)$, $C = (-1, 0, 0)$ je uspořádaná ve smyslu orientace křivky.
7. Ukažte, že $\int_C f(x^2 + y^2 + z^2)(xdx + ydy + zdz)$, kde f je spojitá funkce, je roven nule přes libovolnou uzavřenou křivku C .

Spočtěte následující křivkové integrály

8. $\int_A^B (x^4 + 4xy^3) dx + (6x^2y^2 - 5y^4) dy$, kde $A = (-2, -1)$, $B = (3, 0)$.
9. $\int_A^B (2xy^2 + 3x^2 + \frac{1}{x^2} + \frac{2x}{y^2}) dx + (2x^2y + 3y^2 + \frac{1}{y^2} - \frac{2x^2}{y^3}) dy$, kde $A = (2, 1)$, $B = (1, 2)$ a křivka se nachází uvnitř prvního kvadrantu.
10. $\int_A^B \frac{xdx + ydy + zdz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, kde $A = (0, 0, a)$, $B = (0, b, 0)$ a křivka prochází mimo počátek.

11. Vypočtěte hmotnost hmotného oblouku $x = a \cos t$, $y = a \sin t$, $z = bt$, $t \in (0, 2\pi)$, je-li jeho lineární hustota $\mu(x, y, z) = k(x^2 + y^2 + z^2)$.
12. Najděte těžiště homogenního oblouku kružnice o poloměru a , $0 \leq \varphi \leq 2\alpha$.
13. Spočtěte gravitační sílu, kterou působí homogenní půlkružnice o poloměru R a hmotnosti M na hmotný bod o hmotnosti m ve svém středu.