

# Monstra

## 2. Krize matematiky

Martin Rmoutil

Matematicko-fyzikální fakulta UK

VŠB-TUO, 11. dubna 2023

# Osnova

1 Průlet historií kalkulu

2 Monstra

3 Bonus

## 16.–17 stol.

- Renesanční optimismus a pragmatismus.
- Důrazný řecký požadavek rigorózních důkazů matematických tvrzení ustoupil do pozadí.

Christiaan Huygens – 1657

„K získání důvěry odborníků není důležité, zda jim dáme absolutní důkaz, [...] Zdá se proto, že především musíme sledovat tu metodu, pomocí které lze vše pochopit a stručně a jasně vyložit. **Sobě ušetříme práci se sepisováním, jiným pak se čtením.**“

Problém: složitost úvah roste nad možnosti naší intuice.

Od dob starověku první pokroky v integraci:  
např. Johannes Kepler (1571–1630).

## 16.–17 stol.

- Renesanční optimismus a pragmatismus.
- Důrazný řecký požadavek rigorózních důkazů matematických tvrzení ustoupil do pozadí.

Christiaan Huygens – 1657

„K získání důvěry odborníků není důležité, zda jim dáme absolutní důkaz, [...] Zdá se proto, že především musíme sledovat tu metodu, pomocí které lze vše pochopit a stručně a jasně vyložit. **Sobě ušetříme práci se sepisováním, jiným pak se čtením.**“

Problém: složitost úvah roste nad možnosti naší intuice.

Od dob starověku první pokroky v integraci:  
např. Johannes Kepler (1571–1630).

## 16.–17. stol.

- Renesanční optimismus a pragmatismus.
- Důrazný řecký požadavek rigorózních důkazů matematických tvrzení ustoupil do pozadí.

### Christiaan Huygens – 1657

„K získání důvěry odborníků není důležité, zda jim dáme absolutní důkaz, [...] Zdá se proto, že především musíme sledovat tu metodu, pomocí které lze vše pochopit a stručně a jasně vyložit. **Sobě ušetříme práci se sepisováním, jiným pak se čtením.**“

Problém: složitost úvah roste nad možnosti naší intuice.

Od dob starověku první pokroky v integraci:  
např. Johannes Kepler (1571–1630).

## 16.–17. stol.

- Renesanční optimismus a pragmatismus.
- Důrazný řecký požadavek rigorózních důkazů matematických tvrzení ustoupil do pozadí.

### Christiaan Huygens – 1657

„K získání důvěry odborníků není důležité, zda jim dáme absolutní důkaz, [...] Zdá se proto, že především musíme sledovat tu metodu, pomocí které lze vše pochopit a stručně a jasně vyložit. **Sobě ušetříme práci se sepisováním, jiným pak se čtením.**“

Problém: složitost úvah roste nad možnosti naší intuice.

Od dob starověku první pokroky v integraci:  
např. Johannes Kepler (1571–1630).

## 16.–17 stol.

- Renesanční optimismus a pragmatismus.
- Důrazný řecký požadavek rigorózních důkazů matematických tvrzení ustoupil do pozadí.

### Christiaan Huygens – 1657

„K získání důvěry odborníků není důležité, zda jim dáme absolutní důkaz, [...] Zdá se proto, že především musíme sledovat tu metodu, pomocí které lze vše pochopit a stručně a jasně vyložit. **Sobě ušetříme práci se sepisováním, jiným pak se čtením.**“

Problém: složitost úvah roste nad možnosti naší intuice.

Od dob starověku první pokroky v integraci:  
např. Johannes Kepler (1571–1630).

# Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716)

Pozoroval vztah posloupnosti a příslušné posloupnosti diferencí.

|         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| $N$     |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   | ... |     |
| 1. dif. |  |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |     |
| 2. dif. |  |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | ... |

|         |  |   |   |   |   |    |    |    |    |     |     |     |
|---------|--|---|---|---|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| $N^2$   |  | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 |    | ... |     |     |
| 1. dif. |  |   | 1 | 3 | 5 | 7  | 9  | 11 | 13 | ... |     |     |
| 2. dif. |  |   |   | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2   | ... |     |
| 3. dif. |  |   |   |   | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | ... |

Diference a  $\int$  umace jsou zde navzájem (téměř) inverzní operace.

# Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716)

Pozoroval vztah posloupnosti a příslušné posloupnosti diferencí.

|         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| $N$     |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   | ... |     |
| 1. dif. |  |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |     |
| 2. dif. |  |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | ... |

|         |  |   |   |   |   |    |    |    |    |     |     |     |
|---------|--|---|---|---|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| $N^2$   |  | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 |    | ... |     |     |
| 1. dif. |  |   | 1 | 3 | 5 | 7  | 9  | 11 | 13 | ... |     |     |
| 2. dif. |  |   |   | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2   | ... |     |
| 3. dif. |  |   |   |   | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | ... |

Diference a  $\int$  umace jsou zde navzájem (téměř) inverzní operace.

# Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716)

Pozoroval vztah posloupnosti a příslušné posloupnosti diferencí.

|         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| $N$     |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   | ... |     |
| 1. dif. |  |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |     |
| 2. dif. |  |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | ... |

|         |  |   |   |   |   |    |    |    |    |     |     |     |
|---------|--|---|---|---|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| $N^2$   |  | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 |    | ... |     |     |
| 1. dif. |  |   | 1 | 3 | 5 | 7  | 9  | 11 | 13 | ... |     |     |
| 2. dif. |  |   |   | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2   | ... |     |
| 3. dif. |  |   |   |   | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | ... |

Diference a  $\int$ umace jsou zde navzájem (téměř) inverzní operace.

# Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716)

Pozoroval vztah posloupnosti a příslušné posloupnosti diferencí.

|         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| $N$     |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   | ... |     |
| 1. dif. |  |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |     |
| 2. dif. |  |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | ... |

|         |  |   |   |   |   |    |    |    |    |     |     |     |
|---------|--|---|---|---|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| $N^2$   |  | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 |    | ... |     |     |
| 1. dif. |  |   | 1 | 3 | 5 | 7  | 9  | 11 | 13 | ... |     |     |
| 2. dif. |  |   |   | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2   | ... |     |
| 3. dif. |  |   |   |   | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | ... |

Diference a  $\int$ umace jsou zde navzájem (téměř) inverzní operace.

## Leibniz: publikace v *Acta Eruditorum* (1686)

- Vyložil základy svého nového kalkulu.
- Práce s nekonečně malými (infinitesimálními) veličinami.
- Problém:  $\frac{dy}{dx} = \frac{0}{0}$ . Kritika.
- Snaha vysvětlit s pomocí metafyziky (neúspěšná).

Nicméně odvodil řadu výsledků: Vzorce pro derivování.

Základní věta kalkulu – „N.-L. formule“

$$\int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a).$$

„Důkaz.“  $\int_a^b f'(t) dt = \int \frac{df}{dt} dt = \int df = f(b) - f(a).$  □



## Leibniz: publikace v *Acta Eruditorum* (1686)

- Vyložil základy svého nového kalkulu.
- Práce s nekonečně malými (infinitesimálními) veličinami.
- Problém:  $\frac{dy}{dx} = \frac{0}{0}$ . Kritika.
- Snaha vysvětlit s pomocí metafyziky (neúspěšná).

Nicméně odvodil řadu výsledků: Vzorce pro derivování.

Základní věta kalkulu – „N.-L. formule“

$$\int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a).$$

„Důkaz.“  $\int_a^b f'(t) dt = \int \frac{df}{dt} dt = \int df = f(b) - f(a).$  □



## Leibniz: publikace v *Acta Eruditorum* (1686)

- Vložil základy svého nového kalkulu.
- Práce s nekonečně malými (infinitesimálními) veličinami.
- Problém:  $\frac{dy}{dx} = \frac{0}{0}$ . Kritika.
- Snaha vysvětlit s pomocí metafyziky (neúspěšná).

Nicméně odvodil řadu výsledků: Vzorce pro derivování.

Základní věta kalkulu – „N.-L. formule“

$$\int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a).$$

„Důkaz.“  $\int_a^b f'(t) dt = \int \frac{df}{dt} dt = \int df = f(b) - f(a).$  □



## Leibniz: publikace v *Acta Eruditorum* (1686)

- Vložil základy svého nového kalkulu.
- Práce s nekonečně malými (infinitesimálními) veličinami.
- Problém:  $\frac{dy}{dx} = \frac{0}{0}$ . Kritika.
- Snaha vysvětlit s pomocí metafyziky (neúspěšná).

Nicméně odvodil řadu výsledků: Vzorce pro derivování.

Základní věta kalkulu – „N.-L. formule“

$$\int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a).$$

„Důkaz.“  $\int_a^b f'(t) dt = \int \frac{df}{dt} dt = \int df = f(b) - f(a).$  □



## Leibniz: publikace v *Acta Eruditorum* (1686)

- Vložil základy svého nového kalkulu.
- Práce s nekonečně malými (infinitesimálními) veličinami.
- Problém:  $\frac{dy}{dx} = \frac{0}{0}$ . Kritika.
- Snaha vysvětlit s pomocí metafyziky (neúspěšná).

Nicméně odvodil řadu výsledků: Vzorce pro derivování.

Základní věta kalkulu – „N.-L. formule“

$$\int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a).$$

„Důkaz.“  $\int_a^b f'(t) dt = \int \frac{df}{dt} dt = \int df = f(b) - f(a).$  □



## Leibniz: publikace v *Acta Eruditorum* (1686)

- Vyložil základy svého nového kalkulu.
- Práce s nekonečně malými (infinitesimálními) veličinami.
- Problém:  $\frac{dy}{dx} = \frac{0}{0}$ . Kritika.
- Snaha vysvětlit s pomocí metafyziky (neúspěšná).

Nicméně odvodil řadu výsledků: Vzorce pro derivování.

Základní věta kalkulu – „N.-L. formule“

$$\int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a).$$

„Důkaz.“  $\int_a^b f'(t) dt = \int \frac{df}{dt} dt = \int df = f(b) - f(a).$  □

## Leibniz: publikace v *Acta Eruditorum* (1686)

- Vyložil základy svého nového kalkulu.
- Práce s nekonečně malými (infinitesimálními) veličinami.
- Problém:  $\frac{dy}{dx} = \frac{0}{0}$ . Kritika.
- Snaha vysvětlit s pomocí metafyziky (neúspěšná).

Nicméně odvodil řadu výsledků: Vzorce pro derivování.

### Základní věta kalkulu – „N.-L. formule“

$$\int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a).$$

„Důkaz.“  $\int_a^b f'(t) dt = \int \frac{df}{dt} dt = \int df = f(b) - f(a).$  □

# Isaac Newton (1643-1727) – 1687 publ. PNPM

Nechť je dána křivka  $y = x^2$ . [Používal jinou notaci.]

$$y + dy = (x + dx)^2$$

$$y + dy = x^2 + 2x dx + dx^2$$

$$dy = 2x dx + dx^2$$

$$\frac{dy}{dx} = 2x + dx$$

Nyní zanedbáme  $dx$ . Celkem:  $(x^2)' = 2x$ .

Newton cítil, že podstatou je limitní proces.

Neuměl to vyjádřit, tak občas něco nechal zmizet.

(Kritika: mj. George Berkeley (1685–1753))

# Isaac Newton (1643-1727) – 1687 publ. PNPM

Nechť je dána křivka  $y = x^2$ . [Používal jinou notaci.]

$$y + dy = (x + dx)^2$$

$$y + dy = x^2 + 2x dx + dx^2$$

$$dy = 2x dx + dx^2$$

$$\frac{dy}{dx} = 2x + dx$$

Nyní zanedbáme  $dx$ . Celkem:  $(x^2)' = 2x$ .

Newton cítil, že podstatou je limitní proces.

Neuměl to vyjádřit, tak občas něco nechal zmizet.

(Kritika: mj. George Berkeley (1685–1753))

# Isaac Newton (1643-1727) – 1687 publ. PNPM

Nechť je dána křivka  $y = x^2$ . [Používal jinou notaci.]

$$y + dy = (x + dx)^2$$

$$y + dy = x^2 + 2x dx + dx^2$$

$$dy = 2x dx + dx^2$$

$$\frac{dy}{dx} = 2x + dx$$

Nyní zanedbáme  $dx$ . Celkem:  $(x^2)' = 2x$ .

Newton cítil, že podstatou je limitní proces.

Neuměl to vyjádřit, tak občas něco nechal zmizet.

(Kritika: mj. George Berkeley (1685–1753))

# Isaac Newton (1643-1727) – 1687 publ. PNPM

Nechť je dána křivka  $y = x^2$ . [Používal jinou notaci.]

$$y + dy = (x + dx)^2$$

$$y + dy = x^2 + 2x dx + dx^2$$

$$dy = 2x dx + dx^2$$

$$\frac{dy}{dx} = 2x + dx$$

Nyní zanedbáme  $dx$ . Celkem:  $(x^2)' = 2x$ .

Newton cítil, že podstatou je limitní proces.

Neuměl to vyjádřit, tak občas něco nechal zmizet.

(Kritika: mj. George Berkeley (1685–1753))

## 18. Století: Leonhard Euler (1707–1783)

**Počátek století:** nová metoda na chatrných základech.

Není jasné, co přesně je **infinitesimální** veličina.

Navíc není ani jasné, jak přesně se s ní může pracovat.

Zakladatelé sami chyby (skoro) nedělali. Ostatní občas ano.

Euler: *Introductio in analysin infinitorum* (1748)

- **Funkce** jako centrální pojem MA; značení  $f(x)$ ;
- opatrnost s konvergencí nekonečných řad;
- $e$ , exponenciála,  $e^{i\pi} = -1$  atd.

## 18. Století: Leonhard Euler (1707–1783)

**Počátek století:** nová metoda na chatrných základech.

Není jasné, co přesně je **infinitesimální** veličina.

Navíc není ani jasné, jak přesně se s ní může pracovat.

Zakladatelé sami chyby (skoro) nedělali. Ostatní občas ano.

Euler: *Introductio in analysin infinitorum* (1748)

- **Funkce** jako centrální pojem MA; značení  $f(x)$ ;
- opatrnost s konvergencí nekonečných řad;
- $e$ , exponenciála,  $e^{i\pi} = -1$  atd.

## 18. Století: Leonhard Euler (1707–1783)

**Počátek století:** nová metoda na chatrných základech.  
Není jasné, co přesně je **infinitesimální** veličina.  
Navíc není ani jasné, jak přesně se s ní může pracovat.  
Zakladatelé sami chyby (skoro) nedělali. Ostatní občas ano.

Euler: *Introductio in analysin infinitorum* (1748)

- **Funkce** jako centrální pojem MA; značení  $f(x)$ ;
- opatrnost s konvergencí nekonečných řad;
- $e$ , exponenciála,  $e^{i\pi} = -1$  atd.

## 18. Století: Leonhard Euler (1707–1783)

**Počátek století:** nová metoda na chatrných základech.  
Není jasné, co přesně je **infinitesimální** veličina.  
Navíc není ani jasné, jak přesně se s ní může pracovat.  
Zakladatelé sami chyby (skoro) nedělali. Ostatní občas ano.

Euler: *Introductio in analysin infinitorum* (1748)

- **Funkce** jako centrální pojem MA; značení  $f(x)$ ;
- opatrnost s konvergencí nekonečných řad;
- $e$ , exponenciála,  $e^{i\pi} = -1$  atd.

## 18. Století: Leonhard Euler (1707–1783)

**Počátek století:** nová metoda na chatrných základech.  
Není jasné, co přesně je **infinitesimální** veličina.  
Navíc není ani jasné, jak přesně se s ní může pracovat.  
Zakladatelé sami chyby (skoro) nedělali. Ostatní občas ano.

Euler: *Introductio in analysin infinitorum* (1748)

- **Funkce** jako centrální pojem MA; značení  $f(x)$ ;
- opatrnost s konvergencí nekonečných řad;
- $e$ , exponenciála,  $e^{i\pi} = -1$  atd.

## 18. Století: Leonhard Euler (1707–1783)

**Počátek století:** nová metoda na chatrných základech.  
Není jasné, co přesně je **infinitesimální** veličina.  
Navíc není ani jasné, jak přesně se s ní může pracovat.  
Zakladatelé sami chyby (skoro) nedělali. Ostatní občas ano.

Euler: *Introductio in analysin infinitorum* (1748)

- **Funkce** jako centrální pojem MA; značení  $f(x)$ ;
- opatrnost s konvergencí nekonečných řad;
- $e$ , exponenciála,  $e^{i\pi} = -1$  atd.

Euler: *Institutiones calculi differentialis* (1755):  
První skutečná učebnice, z níž později všichni vychází.

## 18. Století: Leonhard Euler (1707–1783)

**Počátek století:** nová metoda na chatrných základech.  
Není jasné, co přesně je **infinitesimální** veličina.  
Navíc není ani jasné, jak přesně se s ní může pracovat.  
Zakladatelé sami chyby (skoro) nedělali. Ostatní občas ano.

Euler: *Introductio in analysin infinitorum* (1748)

- **Funkce** jako centrální pojem MA; značení  $f(x)$ ;
- opatrnost s konvergencí nekonečných řad;
- $e$ , exponenciála,  $e^{i\pi} = -1$  atd.

**Konec století:** velké množství výsledků v MA ...  
... která stále stojí na chatrných základech.

## 2. Krize matematiky – její projevy

- Jean d'Alembert (1717–1783) – *Encyclopédie* – článek *différentiel*: derivace popsána jako **limita** diferenčních podílů. Článek *limite*: popis pojmu limity („proces“).
- Joseph-Louis Lagrange (1736–1813)  
Teorie analytických funkcí. Problém:  
Terminologie  $\Rightarrow$  („spojitá = analytická“)  $\Rightarrow$  (spoj. má der.)
- Augustin-Louis Cauchy (1789–1857):  $e^{-\frac{1}{x^2}}$  není analytická.  
Nebylo bráno v potaz.

Bylo známo, že MA má problémy. Potřeba upřesnit. Jak?

## 2. Krize matematiky – její projevy

- Jean d'Alembert (1717–1783) – *Encyclopédie* – článek *différentiel*: derivace popsána jako **limita** diferenčních podílů. Článek *limite*: popis pojmu limity („proces“).
- Joseph-Louis Lagrange (1736–1813)  
Teorie analytických funkcí. Problém:  
Terminologie  $\Rightarrow$  („spojitá = analytická“)  $\Rightarrow$  (spoj. má der.)
- Augustin-Louis Cauchy (1789–1857):  $e^{-\frac{1}{x^2}}$  není analytická.  
Nebylo bráno v potaz.

Bylo známo, že MA má problémy. Potřeba upřesnit. Jak?

## 2. Krize matematiky – její projevy

- Jean d'Alembert (1717–1783) – *Encyclopédie* – článek *différentiel*: derivace popsána jako **limita** diferenčních podílů. Článek *limite*: popis pojmu limity („proces“).
- Joseph-Louis Lagrange (1736–1813)  
Teorie analytických funkcí. Problém:  
Terminologie  $\Rightarrow$  („spojitá = analytická“)  $\Rightarrow$  (spoj. má der.)
- Augustin-Louis Cauchy (1789–1857):  $e^{-\frac{1}{x^2}}$  není analytická.  
Nebylo bráno v potaz.

Bylo známo, že MA má problémy. Potřeba upřesnit. Jak?

## 2. Krize matematiky – její projevy

- Jean d'Alembert (1717–1783) – *Encyclopédie* – článek *différentiel*: derivace popsána jako **limita** diferenčních podílů. Článek *limite*: popis pojmu limity („proces“).
- Joseph-Louis Lagrange (1736–1813)  
Teorie analytických funkcí. Problém:  
Terminologie  $\Rightarrow$  („spojitá = analytická“)  $\Rightarrow$  (spoj. má der.)
- Augustin-Louis Cauchy (1789–1857):  $e^{-\frac{1}{x^2}}$  není analytická.  
Nebylo bráno v potaz.

Bylo známo, že MA má problémy. Potřeba upřesnit. Jak?

## 2. Krize matematiky – její projevy

- Jean d'Alembert (1717–1783) – *Encyclopédie* – článek *différentiel*: derivace popsána jako **limita** diferenčních podílů. Článek *limite*: popis pojmu limity („proces“).
- Joseph-Louis Lagrange (1736–1813)  
Teorie analytických funkcí. Problém:  
Terminologie  $\Rightarrow$  („spojitá = analytická“)  $\Rightarrow$  (spoj. má der.)
- Augustin-Louis Cauchy (1789–1857):  $e^{-\frac{1}{x^2}}$  není analytická.  
Nebylo bráno v potaz.

Bylo známo, že MA má problémy. Potřeba upřesnit. Jak?  
Podat přesné **definice**.

## 2. Krize matematiky – její projevy

- Jean d'Alembert (1717–1783) – *Encyclopédie* – článek *différentiel*: derivace popsána jako **limita** diferenčních podílů. Článek *limite*: popis pojmu limity („proces“).
- Joseph-Louis Lagrange (1736–1813)  
Teorie analytických funkcí. Problém:  
Terminologie  $\Rightarrow$  („spojitá = analytická“)  $\Rightarrow$  (spoj. má der.)
- Augustin-Louis Cauchy (1789–1857):  $e^{-\frac{1}{x^2}}$  není analytická.  
Nebylo bráno v potaz.

Bylo známo, že MA má problémy. Potřeba upřesnit. Jak?  
Podat přesné **definice**. A **důkazy**.

## Definice funkce

- Johann Bernoulli (1667–1748), počátek 18. stol: *Funkcí proměnné veličiny se nazývá kvantita sestavená libovolným způsobem z této veličiny a z konstant.*
- Euler, 1755: *Když nějaké kvantity závisejí na jiných tak, že při změně posledních se samy také mění, pak se první nazývají funkcemi druhých. Toto pojmenování má mimořádně širokou povahu, zahrne v sobě všechny možné způsoby, jakými lze jednu kvantitu určit pomocí jiných.*
- Sylvestre François Lacroix (1765–1843), 1797: *Každá veličina, která závisí od jedné nebo několika jiných veličin, se nazývá funkcí těch posledně jmenovaných, když známe nebo neznáme, jaké je nutno provést operace, abychom z nich první veličinu dostali.*
- atd.

## Definice funkce

- Johann Bernoulli (1667–1748), počátek 18. stol: *Funkcí proměnné veličiny se nazývá kvantita sestavená libovolným způsobem z této veličiny a z konstant.*
- Euler, 1755: *Když nějaké kvantity závisejí na jiných tak, že při změně posledních se samy také mění, pak se první nazývají funkcemi druhých. Toto pojmenování má mimořádně širokou povahu, zahrne v sobě všechny možné způsoby, jakými lze jednu kvantitu určit pomocí jiných.*
- Sylvestre François Lacroix (1765–1843), 1797: *Každá veličina, která závisí od jedné nebo několika jiných veličin, se nazývá funkcí těch posledně jmenovaných, když známe nebo neznáme, jaké je nutno provést operace, abychom z nich první veličinu dostali.*
- atd.

## Definice funkce

- Johann Bernoulli (1667–1748), počátek 18. stol: *Funkcí proměnné veličiny se nazývá kvantita sestavená libovolným způsobem z této veličiny a z konstant.*
- Euler, 1755: *Když nějaké kvantity závisejí na jiných tak, že při změně posledních se samy také mění, pak se první nazývají funkcemi druhých. Toto pojmenování má mimořádně širokou povahu, zahrne v sobě všechny možné způsoby, jakými lze jednu kvantitu určit pomocí jiných.*
- Sylvestre François Lacroix (1765–1843), 1797: *Každá veličina, která závisí od jedné nebo několika jiných veličin, se nazývá funkcí těch posledně jmenovaných, když známe nebo neznáme, jaké je nutno provést operace, abychom z nich první veličinu dostali.*
- atd.

## Definice funkce

- Johann Bernoulli (1667–1748), počátek 18. stol: *Funkcí proměnné veličiny se nazývá kvantita sestavená libovolným způsobem z této veličiny a z konstant.*
- Euler, 1755: *Když nějaké kvantity závisejí na jiných tak, že při změně posledních se samy také mění, pak se první nazývají funkcemi druhých. Toto pojmenování má mimořádně širokou povahu, zahrne v sobě všechny možné způsoby, jakými lze jednu kvantitu určit pomocí jiných.*
- Sylvestre François Lacroix (1765–1843), 1797: *Každá veličina, která závisí od jedné nebo několika jiných veličin, se nazývá funkcí těch posledně jmenovaných, když známe nebo neznáme, jaké je nutno provést operace, abychom z nich první veličinu dostali.*
- atd.

# „Spojitost formy“

V 18. století přetrvávalo – navzdory obecné definici – strnulé pojetí pojmu funkce.

## „Spojitost formy funkce“

Pro MA jsou vhodné funkce, pro jejichž zadání slouží stálý analytický výraz. (Tj. jeden vzorec.) Nespojitost je tedy chápána jako jistá nestálost popisu vzorcem.

Zaměřováno s dnešním pojmem spojitosti.

Nejasnosti ukončil až P.G. Lejeune Dirichlet (1805–1859) v roce 1837 podáním celkem dobré definice (moderní) spojitosti funkce. Jistě i pod vlivem Fouriera.

# „Spojitost formy“

V 18. století přetrvávalo – navzdory obecné definici – strnulé pojetí pojmu funkce.

## „Spojitost formy funkce“

Pro MA jsou vhodné funkce, pro jejichž zadání slouží stálý analytický výraz. (Tj. jeden vzorec.) Nespojité je tedy chápáno jako jistá nestálost popisu vzorcem.

Zaměřováno s dnešním pojmem spojitosti.

Nejasnosti ukončil až P.G. Lejeune Dirichlet (1805–1859) v roce 1837 podáním celkem dobré definice (moderní) spojitosti funkce. Jistě i pod vlivem Fouriera.

## „Spojitost formy“

V 18. století přetrvávalo – navzdory obecné definici – strnulé pojetí pojmu funkce.

### „Spojitost formy funkce“

Pro MA jsou vhodné funkce, pro jejichž zadání slouží stálý analytický výraz. (Tj. jeden vzorec.) Nespojitost je tedy chápána jako jistá nestálost popisu vzorcem.

Zaměřováno s dnešním pojmem spojitosti.

Nejasnosti ukončil až P.G. Lejeune Dirichlet (1805–1859) v roce 1837 podáním celkem dobré definice (moderní) spojitosti funkce. Jistě i pod vlivem Fouriera.

## „Spojitost formy“

V 18. století přetrvávalo – navzdory obecné definici – strnulé pojetí pojmu funkce.

### „Spojitost formy funkce“

Pro MA jsou vhodné funkce, pro jejichž zadání slouží stálý analytický výraz. (Tj. jeden vzorec.) Nespojitost je tedy chápána jako jistá nestálost popisu vzorcem.

Zaměřováno s dnešním pojmem spojitosti.

Nejasnosti ukončil až P.G. Lejeune Dirichlet (1805–1859) v roce 1837 podáním celkem dobré definice (moderní) spojitosti funkce.

Jistě i pod vlivem Fouriera.

## „Spojitost formy“

V 18. století přetrvávalo – navzdory obecné definici – strnulé pojetí pojmu funkce.

### „Spojitost formy funkce“

Pro MA jsou vhodné funkce, pro jejichž zadání slouží stálý analytický výraz. (Tj. jeden vzorec.) Nespojitost je tedy chápána jako jistá nestálost popisu vzorcem.

Zaměřováno s dnešním pojmem spojitosti.

Nejasnosti ukončil až P.G. Lejeune Dirichlet (1805–1859) v roce 1837 podáním celkem dobré definice (moderní) spojitosti funkce. Jistě i pod vlivem Fouriera.

# Trigonometrické řady – spojitá forma & nespojitý součet

J. Fourier (1768–1830): *Theorie analytique de la chaleur* (1822)

Zkoumal vedení tepla, a tedy i Laplaceovu rovnici:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad (x, y) \in [0, \pi] \times [0, \infty),$$

$$u(0, y) = u(\pi, y) = 0 \quad \text{a} \quad u(x, 0) = \varphi(x).$$

Dospěl k řešení tvaru

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-ny} \sin nx, \quad \text{kde} \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \varphi(x) \sin nx \, dx.$$

Tento vzorec byl „OK“, ale mohl dát nespojitý součet.

# Trigonometrické řady – spojitá forma & nespojitý součet

J. Fourier (1768–1830): *Theorie analytique de la chaleur* (1822)

Zkoumal vedení tepla, a tedy i Laplaceovu rovnici:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad (x, y) \in [0, \pi] \times [0, \infty),$$

$$u(0, y) = u(\pi, y) = 0 \quad \text{a} \quad u(x, 0) = \varphi(x).$$

Dospěl k řešení tvaru

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-ny} \sin nx, \quad \text{kde} \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \varphi(x) \sin nx \, dx.$$

Tento vzorec byl „OK“, ale mohl dát nespojitý součet.

# Trigonometrické řady – spojitá forma & nespojitý součet

J. Fourier (1768–1830): *Theorie analytique de la chaleur* (1822)

Zkoumal vedení tepla, a tedy i Laplaceovu rovnici:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad (x, y) \in [0, \pi] \times [0, \infty),$$

$$u(0, y) = u(\pi, y) = 0 \quad \text{a} \quad u(x, 0) = \varphi(x).$$

Dospěl k řešení tvaru

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-ny} \sin nx, \quad \text{kde} \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \varphi(x) \sin nx \, dx.$$

Tento vzorec byl „OK“, ale mohl dát nespojitý součet.

# Trigonometrické řady – spojitá forma & nespojitý součet

J. Fourier (1768–1830): *Theorie analytique de la chaleur* (1822)

Zkoumal vedení tepla, a tedy i Laplaceovu rovnici:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad (x, y) \in [0, \pi] \times [0, \infty),$$

$$u(0, y) = u(\pi, y) = 0 \quad \text{a} \quad u(x, 0) = \varphi(x).$$

Dospěl k řešení tvaru

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-ny} \sin nx, \quad \text{kde} \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \varphi(x) \sin nx \, dx.$$

Tento vzorec byl „OK“, ale mohl dát nespojitý součet.

# Trigonometrické řady – spojitá forma & nespojitý součet

J. Fourier (1768–1830): *Theorie analytique de la chaleur* (1822)

Zkoumal vedení tepla, a tedy i Laplaceovu rovnici:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad (x, y) \in [0, \pi] \times [0, \infty),$$

$$u(0, y) = u(\pi, y) = 0 \quad \text{a} \quad u(x, 0) = \varphi(x).$$

Dospěl k řešení tvaru

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-ny} \sin nx, \quad \text{kde} \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \varphi(x) \sin nx \, dx.$$

Tento vzorec byl „OK“, ale mohl dát nespojitý součet.

## Augustin-Louis Cauchy (1789–1857) – limita

- *Cours d'Analyse de l'École Royale Polytechnique* (1821): Učebnice MA založená na správné (slovní) definici **limity**.
- „Usmířil infinitesimály s přesností“: infin.  $\equiv$  veličina  $\rightarrow 0$ .
- Zcela jasná definice **derivace** (pomocí limity).

Slavná chyba! (Protipříklad: N.H. Abel, 1826)

Nechť jsou  $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  spoj. a  $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  konečná na  $\mathbb{R}$ .  
Pak  $f$  je spojitá na  $\mathbb{R}$ .

- Cauchy to opravil r. 1853.  
Přesně popsal pojem **stejněměrné konvergence**.
- Do obecného povědomí prosadil až Karl Weierstrass (1815–1897): **aritmetizace MA** („ $\varepsilon$ - $\delta$  gymnastika“).

## Augustin-Louis Cauchy (1789–1857) – limita

- *Cours d'Analyse de l'École Royale Polytechnique* (1821): Učebnice MA založená na správné (slovní) definici **limity**.
- „Usmířil infinitesimály s přesností“: infin.  $\equiv$  veličina  $\rightarrow 0$ .
- Zcela jasná definice **derivace** (pomocí limity).

Slavná chyba! (Protipříklad: N.H. Abel, 1826)

Nechť jsou  $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  spoj. a  $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  konečná na  $\mathbb{R}$ .  
Pak  $f$  je spojitá na  $\mathbb{R}$ .

- Cauchy to opravil r. 1853.  
Přesně popsal pojem **stejněměrné konvergence**.
- Do obecného povědomí prosadil až Karl Weierstrass (1815–1897): **aritmetizace MA** („ $\varepsilon$ - $\delta$  gymnastika“).

## Augustin-Louis Cauchy (1789–1857) – limita

- *Cours d'Analyse de l'École Royale Polytechnique* (1821): Učebnice MA založená na správné (slovní) definici **limity**.
- „Usmířil infinitesimály s přesností“: infin.  $\equiv$  veličina  $\rightarrow 0$ .
- Zcela jasná definice **derivace** (pomocí limity).

Slavná chyba! (Protipříklad: N.H. Abel, 1826)

Nechť jsou  $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  spoj. a  $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  konečná na  $\mathbb{R}$ .  
Pak  $f$  je spojitá na  $\mathbb{R}$ .

- Cauchy to opravil r. 1853.  
Přesně popsal pojem **stejněměrné konvergence**.
- Do obecného povědomí prosadil až Karl Weierstrass (1815–1897): **aritmetizace MA** („ $\varepsilon$ - $\delta$  gymnastika“).

## Augustin-Louis Cauchy (1789–1857) – limita

- *Cours d'Analyse de l'École Royale Polytechnique* (1821): Učebnice MA založená na správné (slovní) definici **limity**.
- „Usmířil infinitesimály s přesností“: infin.  $\equiv$  veličina  $\rightarrow 0$ .
- Zcela jasná definice **derivace** (pomocí limity).

### Slavná chyba! (Protipříklad: N.H. Abel, 1826)

Nechť jsou  $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  spoj. a  $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  konečná na  $\mathbb{R}$ .  
Pak  $f$  je spojitá na  $\mathbb{R}$ .

- Cauchy to opravil r. 1853.  
Přesně popsal pojem **stejněměrné konvergence**.
- Do obecného povědomí prosadil až Karl Weierstrass (1815–1897): **aritmetizace MA** („ $\varepsilon$ - $\delta$  gymnastika“).

## Augustin-Louis Cauchy (1789–1857) – limita

- *Cours d'Analyse de l'École Royale Polytechnique* (1821): Učebnice MA založená na správné (slovní) definici **limity**.
- „Usmířil infinitesimály s přesností“: infin.  $\equiv$  veličina  $\rightarrow 0$ .
- Zcela jasná definice **derivace** (pomocí limity).

### Slavná chyba! (Protipříklad: N.H. Abel, 1826)

Nechť jsou  $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  spoj. a  $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  konečná na  $\mathbb{R}$ .  
Pak  $f$  je spojitá na  $\mathbb{R}$ .

- Cauchy to opravil r. 1853.  
Přesně popsal pojem **stejněměrné konvergence**.
- Do obecného povědomí prosadil až Karl Weierstrass (1815–1897): **aritmetizace MA** („ $\varepsilon$ - $\delta$  gymnastika“).

## Augustin-Louis Cauchy (1789–1857) – limita

- *Cours d'Analyse de l'École Royale Polytechnique* (1821): Učebnice MA založená na správné (slovní) definici **limity**.
- „Usmířil infinitesimály s přesností“: infin.  $\equiv$  veličina  $\rightarrow 0$ .
- Zcela jasná definice **derivace** (pomocí limity).

### Slavná chyba! (Protipříklad: N.H. Abel, 1826)

Nechť jsou  $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  spoj. a  $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  konečná na  $\mathbb{R}$ .  
Pak  $f$  je spojitá na  $\mathbb{R}$ .

- Cauchy to opravil r. 1853.  
Přesně popsal pojem **stejněměrné konvergence**.
- Do obecného povědomí prosadil až Karl Weierstrass (1815–1897): **aritmetizace MA** („ $\varepsilon$ - $\delta$  gymnastika“).

## Další chyby

- Přehazování limitních procesů bylo běžné. Ale:
- Jean-Gaston Darboux (1842–1917): Příklad nestejnoměrně konvergentní řady spoj. fcí se spojitým součtem.
- Pro tuto řadu navíc nelze přehodit sumu a integrál, tj.

$$\int \sum_{n=1}^{\infty} f_n \neq \sum_{n=1}^{\infty} \int f_n.$$

André-Marie Ampère (1775–1836) – návaznost na Lagrange – 1806

Každá analytická funkce je diferencovatelná.

Tato věta platí. Ovšem kvůli nejasným definicím byla obecně interpretována jako tvrzení diferencovatelnosti libovolné spoj. fce.

## Další chyby

- Přehazování limitních procesů bylo běžné. Ale:
- Jean-Gaston Darboux (1842–1917): Příklad nesterjnoměrně konvergentní řady spoj. fcí se spojitým součtem.
- Pro tuto řadu navíc nelze přehodit sumu a integrál, tj.

$$\int \sum_{n=1}^{\infty} f_n \neq \sum_{n=1}^{\infty} \int f_n.$$

André-Marie Ampère (1775–1836) – návaznost na Lagrange – 1806

Každá analytická funkce je diferencovatelná.

Tato věta platí. Ovšem kvůli nejasným definicím byla obecně interpretována jako tvrzení diferencovatelnosti libovolné spoj. fce.

## Další chyby

- Přehazování limitních procesů bylo běžné. Ale:
- Jean-Gaston Darboux (1842–1917): Příklad nestejnoměrně konvergentní řady spoj. fcí se spojitým součtem.
- Pro tuto řadu navíc nelze přehodit sumu a integrál, tj.

$$\int \sum_{n=1}^{\infty} f_n \neq \sum_{n=1}^{\infty} \int f_n.$$

André-Marie Ampère (1775–1836) – návaznost na Lagrange – 1806

Každá analytická funkce je diferencovatelná.

Tato věta platí. Ovšem kvůli nejasným definicím byla obecně interpretována jako tvrzení diferencovatelnosti libovolné spoj. fce.

## Další chyby

- Přehazování limitních procesů bylo běžné. Ale:
- Jean-Gaston Darboux (1842–1917): Příklad nestejnoměrně konvergentní řady spoj. fcí se spojitým součtem.
- Pro tuto řadu navíc nelze přehodit sumu a integrál, tj.

$$\int \sum_{n=1}^{\infty} f_n \neq \sum_{n=1}^{\infty} \int f_n.$$

André-Marie Ampère (1775–1836) – návaznost na Lagrange – 1806

Každá analytická funkce je diferencovatelná.

Tato věta platí. Ovšem kvůli nejasným definicím byla obecně interpretována jako tvrzení diferencovatelnosti libovolné spoj. fce.

# Osnova

1 Průlet historií kalkulu

2 Monstra

3 Bonus

Weierstrassovo monstrum:      Zde  $a = 7, b = \frac{5}{6}$ 

Karl Weierstrass (1815–1897)

## Definice

Řekneme, že funkce  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  je *monstrum*, pokud je spojitá a zároveň nemá v žádném bodě konečnou derivaci.

## Věta (1872)

*Nechť  $a \in \mathbb{N}$  je liché,  $b \in (0, 1)$  a platí  $a \cdot b > 1 + \frac{2\pi}{3}$ . Pak  $W$  je monstrum.*

$$W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b^n \cos(a^n \pi x)$$



# Weierstrassovo monstrum:      Zde $a = 7, b = \frac{5}{6}$

Karl Weierstrass (1815–1897)


## Definice

Řekneme, že funkce  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  je *monstrum*, pokud je spojitá a zároveň nemá v žádném bodě konečnou derivaci.


## Věta (1872)

*Nechť  $a \in \mathbb{N}$  je liché,  $b \in (0, 1)$  a platí  $a \cdot b > 1 + \frac{2\pi}{3}$ . Pak  $W$  je monstrum.*


$$W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b^n \cos(a^n \pi x)$$




# První tři iterace




# První tři iterace




# První tři iterace



$$a = 7, b = \frac{5}{6} \quad \text{—} \quad W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b^n \cos(a^n \pi x)$$



$$a = 5, b = \frac{2}{5} \quad \text{—} \quad W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b^n \cos(a^n \pi x)$$



# Bolzanova funkce

Jeden z prvních příkladů monstra podal náš Bernard Bolzano (1781–1848).

- Věděl, že to je podivná funkce, ale neuměl úplně dokázat, že to je monstrum. Je z jeho nepubl. knihy *Functionenlehre* z roku 1834.
- Zabýval se zpřesňováním důkazů i definic v matematice, principy myšlení.

## Věta (Bolzanova)

*Nechť  $f: \langle 0, 1 \rangle \rightarrow \mathbb{R}$  je spojitá a  $f(0) < 0 < f(1)$ . Pak existuje bod  $x_0 \in (0, 1)$ , pro nějž  $f(x_0) = 0$ .*



BOLZANO

# Bolzanova funkce

Jeden z prvních příkladů monstra podal náš Bernard Bolzano (1781–1848).

- Věděl, že to je podivná funkce, ale neuměl úplně dokázat, že to je monstrum. Je z jeho nepubl. knihy *Functionenlehre* z roku 1834.
- Zabýval se zpřesňováním důkazů i definic v matematice, principy myšlení.

## Věta (Bolzanova)

*Nechť  $f: \langle 0, 1 \rangle \rightarrow \mathbb{R}$  je spojitá a  $f(0) < 0 < f(1)$ . Pak existuje bod  $x_0 \in (0, 1)$ , pro nějž  $f(x_0) = 0$ .*



BOLZANO

# Bolzanova funkce

Jeden z prvních příkladů monstra podal náš Bernard Bolzano (1781–1848).

- Věděl, že to je podivná funkce, ale neuměl úplně dokázat, že to je monstrum. Je z jeho nepubl. knihy *Functionenlehre* z roku 1834.
- Zabýval se zpřesňováním důkazů i definic v matematice, principy myšlení.

## Věta (Bolzanova)

*Nechť  $f: \langle 0, 1 \rangle \rightarrow \mathbb{R}$  je spojitá a  $f(0) < 0 < f(1)$ . Pak existuje bod  $x_0 \in (0, 1)$ , pro nějž  $f(x_0) = 0$ .*



BOLZANO

# Bolzanova funkce

Jeden z prvních příkladů monstra podal náš Bernard Bolzano (1781–1848).

- Věděl, že to je podivná funkce, ale neuměl úplně dokázat, že to je monstrum. Je z jeho nepubl. knihy *Functionenlehre* z roku 1834.
- Zabýval se zpřesňováním důkazů i definic v matematice, principy myšlení.


## Věta (Bolzanova)

Nechť  $f: \langle 0, 1 \rangle \rightarrow \mathbb{R}$  je spojitá a  $f(0) < 0 < f(1)$ . Pak existuje bod  $x_0 \in (0, 1)$ , pro nějž  $f(x_0) = 0$ .



BOLZANO

# Bolzanova funkce (1834)



## Jsou monstra singulární případy?


Stefan Banach (1892–1945) dokázal:

Věta (Banach, Mazurkiewicz)

„Většina“ spojitých funkcí na intervalu  $\langle 0, 1 \rangle$  jsou monstra.

Co je „většina“? Je potřeba naučit se nějak „měřit“ velikost množin funkcí.

Sofistikovaným postupem se ukáže, že ne-monster je zanedbatelné množství.



BANACH

## Jsou monstra singulární případy?


Stefan Banach (1892–1945) dokázal:

Věta (Banach, Mazurkiewicz)

„Většina“ spojitých funkcí na intervalu  $\langle 0, 1 \rangle$  jsou monstra.

Co je „většina“? Je potřeba naučit se nějak „měřit“ velikost množin funkcí.

Sofistikovaným postupem se ukáže, že ne-monster je zanedbatelné množství.



BANACH

## Jsou monstra singulární případy?


Stefan Banach (1892–1945) dokázal:

Věta (Banach, Mazurkiewicz)

„Většina“ spojitých funkcí na intervalu  $\langle 0, 1 \rangle$  jsou monstra.

Co je „většina“? Je potřeba naučit se nějak „měřit“ velikost množin funkcí.

Sofistikovaným postupem se ukáže, že ne-monster je zanedbatelné množství.



BANACH

## Jsou monstra singulární případy?

Stefan Banach (1892–1945) dokázal:


Věta (Banach, Mazurkiewicz)

„Většina“ spojitých funkcí na intervalu  $\langle 0, 1 \rangle$  jsou monstra.

Co je „většina“? Je potřeba naučit se nějak „měřit“ velikost množin funkcí.

Sofistikovaným postupem se ukáže, že ne-monster je zanedbatelné množství.

*Pro naši intuici velká rána.*



BANACH

# René-Louis Baire (1874–1932)

## Baireova věta

Bud'  $X$  úplný metrický prostor a  $G_n \subseteq X$  otevřené husté.

Pak  $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n \neq \emptyset$  (dokonce hustá v  $X$ ).

Alternativní formulace používá množiny 1. kategorie:

## Definice

Bud'  $X$  MP. Pak  $F \subseteq X$  je *řidká*, pokud  $X \setminus \bar{F}$  je hustá v  $X$ .

Množina  $M \subseteq X$  je *1. kategorie*, jestliže  $M = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ , kde  $F_n$  jsou řídké.

## Baireova věta (2. formulace)

Úplný MP  $X$  není 1. kategorie v sobě.

# René-Louis Baire (1874–1932)

## Baireova věta

Bud'  $X$  úplný metrický prostor a  $G_n \subseteq X$  otevřené husté.

Pak  $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n \neq \emptyset$  (dokonce hustá v  $X$ ).

Alternativní formulace používá množiny 1. kategorie:

## Definice

Bud'  $X$  MP. Pak  $F \subseteq X$  je *řidká*, pokud  $X \setminus \bar{F}$  je hustá v  $X$ .

Množina  $M \subseteq X$  je *1. kategorie*, jestliže  $M = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ , kde  $F_n$  jsou řídké.

## Baireova věta (2. formulace)

Úplný MP  $X$  není 1. kategorie v sobě.

# René-Louis Baire (1874–1932)

## Baireova věta

Bud'  $X$  úplný metrický prostor a  $G_n \subseteq X$  otevřené husté.

Pak  $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n \neq \emptyset$  (dokonce hustá v  $X$ ).

Alternativní formulace používá množiny 1. kategorie:

## Definice

Bud'  $X$  MP. Pak  $F \subseteq X$  je *řidká*, pokud  $X \setminus \bar{F}$  je hustá v  $X$ .

Množina  $M \subseteq X$  je *1. kategorie*, jestliže  $M = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ , kde  $F_n$  jsou řídké.

## Baireova věta (2. formulace)

Úplný MP  $X$  není 1. kategorie v sobě.

# René-Louis Baire (1874–1932)

## Baireova věta

Bud'  $X$  úplný metrický prostor a  $G_n \subseteq X$  otevřené husté.

Pak  $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n \neq \emptyset$  (dokonce hustá v  $X$ ).

Alternativní formulace používá množiny 1. kategorie:

## Definice

Bud'  $X$  MP. Pak  $F \subseteq X$  je *řídka*, pokud  $X \setminus \bar{F}$  je hustá v  $X$ .

Množina  $M \subseteq X$  je *1. kategorie*, jestliže  $M = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ , kde  $F_n$  jsou řídké.

## Baireova věta (2. formulace)

Úplný MP  $X$  není 1. kategorie v sobě.

# René-Louis Baire (1874–1932)

## Baireova věta

Bud'  $X$  úplný metrický prostor a  $G_n \subseteq X$  otevřené husté.

Pak  $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n \neq \emptyset$  (dokonce hustá v  $X$ ).

Alternativní formulace používá množiny 1. kategorie:

## Definice

Bud'  $X$  MP. Pak  $F \subseteq X$  je *řídka*, pokud  $X \setminus \bar{F}$  je hustá v  $X$ .

Množina  $M \subseteq X$  je *1. kategorie*, jestliže  $M = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ , kde  $F_n$  jsou řídké.

## Baireova věta (2. formulace)

Úplný MP  $X$  není 1. kategorie v sobě.

## Věta

Existuje spojitá  $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ , která nemá vlastní derivaci v žádném bodě.

Důkaz. Pracujeme v úplném MP  $C[0, 1]$  s maximovou normou:

$\|f\| = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|$ . Položíme

$$S_n = \{f \in C[0, 1] : (\exists x \in [0, 1])(\forall y \in [0, 1]) |f(y) - f(x)| \leq n|y - x|\}$$

a dokážeme (pro každé  $n \in \mathbb{N}$ ):

- a  $S_n$  je uzavřená;
- b doplněk  $S_n$  je hustý;
- c pokud pro nějaké  $x \in [0, 1]$  existuje  $f'(x)$ , pak  $f \in \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$ .

První dva body dávají, že  $S_n$  jsou řídké. Podle Baireovy věty tedy

$$C[0, 1] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n \neq \emptyset.$$

## Věta

Existuje spojitá  $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ , která nemá vlastní derivaci v žádném bodě.

*Důkaz.* Pracujeme v úplném MP  $C[0, 1]$  s maximovou normou:

$$\|f\| = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|. \quad \text{Položíme}$$

$$S_n = \{f \in C[0, 1] : (\exists x \in [0, 1])(\forall y \in [0, 1]) |f(y) - f(x)| \leq n|y - x|\}$$

a dokážeme (pro každé  $n \in \mathbb{N}$ ):

- a  $S_n$  je uzavřená;
- b doplněk  $S_n$  je hustý;
- c pokud pro nějaké  $x \in [0, 1]$  existuje  $f'(x)$ , pak  $f \in \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$ .

První dva body dávají, že  $S_n$  jsou řídké. Podle Baireovy věty tedy

$$C[0, 1] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n \neq \emptyset.$$

## Věta

Existuje spojitá  $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ , která nemá vlastní derivaci v žádném bodě.

*Důkaz.* Pracujeme v úplném MP  $C[0, 1]$  s maximovou normou:

$$\|f\| = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|. \quad \text{Položíme}$$

$$S_n = \{f \in C[0, 1] : (\exists x \in [0, 1])(\forall y \in [0, 1]) |f(y) - f(x)| \leq n|y - x|\}$$

a dokážeme (pro každé  $n \in \mathbb{N}$ ):

- a  $S_n$  je uzavřená;
- b doplněk  $S_n$  je hustý;
- c pokud pro nějaké  $x \in [0, 1]$  existuje  $f'(x)$ , pak  $f \in \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$ .

První dva body dávají, že  $S_n$  jsou řídké. Podle Baireovy věty tedy

$$C[0, 1] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n \neq \emptyset.$$

## Věta

Existuje spojitá  $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ , která nemá vlastní derivaci v žádném bodě.

*Důkaz.* Pracujeme v úplném MP  $C[0, 1]$  s maximovou normou:

$$\|f\| = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|. \quad \text{Položíme}$$

$$S_n = \{f \in C[0, 1] : (\exists x \in [0, 1])(\forall y \in [0, 1]) |f(y) - f(x)| \leq n|y - x|\}$$

a dokážeme (pro každé  $n \in \mathbb{N}$ ):

- a  $S_n$  je uzavřená;
- b doplněk  $S_n$  je hustý;
- c pokud pro nějaké  $x \in [0, 1]$  existuje  $f'(x)$ , pak  $f \in \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$ .

První dva body dávají, že  $S_n$  jsou řídké. Podle Baireovy věty tedy

$$C[0, 1] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n \neq \emptyset.$$

## Věta

Existuje spojitá  $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ , která nemá vlastní derivaci v žádném bodě.

*Důkaz.* Pracujeme v úplném MP  $C[0, 1]$  s maximovou normou:

$$\|f\| = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|. \quad \text{Položíme}$$

$$S_n = \{f \in C[0, 1] : (\exists x \in [0, 1])(\forall y \in [0, 1]) |f(y) - f(x)| \leq n|y - x|\}$$

a dokážeme (pro každé  $n \in \mathbb{N}$ ):

- a**  $S_n$  je uzavřená;
- b** doplněk  $S_n$  je hustý;
- c** pokud pro nějaké  $x \in [0, 1]$  existuje  $f'(x)$ , pak  $f \in \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$ .

První dva body dávají, že  $S_n$  jsou řídké. Podle Baireovy věty tedy

$$C[0, 1] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n \neq \emptyset.$$

## Věta

Existuje spojitá  $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ , která nemá vlastní derivaci v žádném bodě.

*Důkaz.* Pracujeme v úplném MP  $C[0, 1]$  s maximovou normou:

$$\|f\| = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|. \quad \text{Položíme}$$

$$S_n = \{f \in C[0, 1] : (\exists x \in [0, 1])(\forall y \in [0, 1]) |f(y) - f(x)| \leq n|y - x|\}$$

a dokážeme (pro každé  $n \in \mathbb{N}$ ):

- a**  $S_n$  je uzavřená;
- b** doplněk  $S_n$  je hustý;
- c** pokud pro nějaké  $x \in [0, 1]$  existuje  $f'(x)$ , pak  $f \in \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$ .

První dva body dávají, že  $S_n$  jsou řídké. Podle Baireovy věty tedy

$$C[0, 1] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n \neq \emptyset.$$

## Věta

Existuje spojitá  $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ , která nemá vlastní derivaci v žádném bodě.

*Důkaz.* Pracujeme v úplném MP  $C[0, 1]$  s maximovou normou:

$$\|f\| = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|. \quad \text{Položíme}$$

$$S_n = \{f \in C[0, 1] : (\exists x \in [0, 1])(\forall y \in [0, 1]) |f(y) - f(x)| \leq n|y - x|\}$$

a dokážeme (pro každé  $n \in \mathbb{N}$ ):

- a**  $S_n$  je uzavřená;
- b** doplněk  $S_n$  je hustý;
- c** pokud pro nějaké  $x \in [0, 1]$  existuje  $f'(x)$ , pak  $f \in \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$ .

První dva body dávají, že  $S_n$  jsou řídké. Podle Baireovy věty tedy

$$C[0, 1] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n \neq \emptyset.$$

Ad a)  $S_n$  je uzavřená.

$$S_n = \{f \in C[0, 1]: (\exists x \in [0, 1])(\forall y \in [0, 1]) |f(y) - f(x)| \leq n|y - x|\}$$

$S_n$  je uzavřená: Necht'  $f_k \in S_n$ ,  $f_k \rightarrow f$ . Najdeme  $x_k \in [0, 1]$ , že

$$(\forall y \in [0, 1]) |f_k(y) - f_k(x_k)| \leq n|y - x_k|.$$

BŮNO  $x_k \rightarrow x \in [0, 1]$ . Nyní pro libovolné  $y \in [0, 1]$  platí:

$$\begin{aligned} |f(y) - f(x)| &\leq |f(y) - f(x_k)| + |f(x_k) - f(x)| \\ &\leq |f_k(y) - f_k(x_k)| + 2\|f - f_k\| + |f(x_k) - f(x)| \\ &\leq n|y - x_k| + 2\|f - f_k\| + |f(x_k) - f(x)| \\ &\rightarrow n|y - x|. \end{aligned}$$

Dostáváme  $|f(y) - f(x)| \leq n|y - x|$ , takže  $f \in S_n$ , a  $S_n$  je uzavřená.

Ad a)  $S_n$  je uzavřená.

$$S_n = \{f \in C[0, 1] : (\exists x \in [0, 1])(\forall y \in [0, 1]) |f(y) - f(x)| \leq n|y - x|\}$$

$S_n$  je uzavřená: Necht'  $f_k \in S_n$ ,  $f_k \rightarrow f$ . Najdeme  $x_k \in [0, 1]$ , že

$$(\forall y \in [0, 1]) |f_k(y) - f_k(x_k)| \leq n|y - x_k|.$$

BŮNO  $x_k \rightarrow x \in [0, 1]$ . Nyní pro libovolné  $y \in [0, 1]$  platí:

$$\begin{aligned} |f(y) - f(x)| &\leq |f(y) - f(x_k)| + |f(x_k) - f(x)| \\ &\leq |f_k(y) - f_k(x_k)| + 2\|f - f_k\| + |f(x_k) - f(x)| \\ &\leq n|y - x_k| + 2\|f - f_k\| + |f(x_k) - f(x)| \\ &\rightarrow n|y - x|. \end{aligned}$$

Dostáváme  $|f(y) - f(x)| \leq n|y - x|$ , takže  $f \in S_n$ , a  $S_n$  je uzavřená.

Ad a)  $S_n$  je uzavřená.

$$S_n = \{f \in C[0, 1] : (\exists x \in [0, 1])(\forall y \in [0, 1]) |f(y) - f(x)| \leq n|y - x|\}$$

$S_n$  je uzavřená: Necht'  $f_k \in S_n$ ,  $f_k \rightarrow f$ . Najdeme  $x_k \in [0, 1]$ , že

$$(\forall y \in [0, 1]) |f_k(y) - f_k(x_k)| \leq n|y - x_k|.$$

BŮNO  $x_k \rightarrow x \in [0, 1]$ . Nyní pro libovolné  $y \in [0, 1]$  platí:

$$\begin{aligned} |f(y) - f(x)| &\leq |f(y) - f(x_k)| + |f(x_k) - f(x)| \\ &\leq |f_k(y) - f_k(x_k)| + 2\|f - f_k\| + |f(x_k) - f(x)| \\ &\leq n|y - x_k| + 2\|f - f_k\| + |f(x_k) - f(x)| \\ &\rightarrow n|y - x|. \end{aligned}$$

Dostáváme  $|f(y) - f(x)| \leq n|y - x|$ , takže  $f \in S_n$ , a  $S_n$  je uzavřená.

Ad a)  $S_n$  je uzavřená.

$$S_n = \{f \in C[0, 1] : (\exists x \in [0, 1])(\forall y \in [0, 1]) |f(y) - f(x)| \leq n|y - x|\}$$

$S_n$  je uzavřená: Necht'  $f_k \in S_n$ ,  $f_k \rightarrow f$ . Najdeme  $x_k \in [0, 1]$ , že

$$(\forall y \in [0, 1]) |f_k(y) - f_k(x_k)| \leq n|y - x_k|.$$

BŮNO  $x_k \rightarrow x \in [0, 1]$ . Nyní pro libovolné  $y \in [0, 1]$  platí:

$$\begin{aligned} |f(y) - f(x)| &\leq |f(y) - f(x_k)| + |f(x_k) - f(x)| \\ &\leq |f_k(y) - f_k(x_k)| + 2\|f - f_k\| + |f(x_k) - f(x)| \\ &\leq n|y - x_k| + 2\|f - f_k\| + |f(x_k) - f(x)| \\ &\rightarrow n|y - x|. \end{aligned}$$

Dostáváme  $|f(y) - f(x)| \leq n|y - x|$ , takže  $f \in S_n$ , a  $S_n$  je uzavřená.

Ad a)  $S_n$  je uzavřená.

$$S_n = \{f \in C[0, 1] : (\exists x \in [0, 1])(\forall y \in [0, 1]) |f(y) - f(x)| \leq n|y - x|\}$$

$S_n$  je uzavřená: Necht'  $f_k \in S_n$ ,  $f_k \rightarrow f$ . Najdeme  $x_k \in [0, 1]$ , že

$$(\forall y \in [0, 1]) |f_k(y) - f_k(x_k)| \leq n|y - x_k|.$$

BŮNO  $x_k \rightarrow x \in [0, 1]$ . Nyní pro libovolné  $y \in [0, 1]$  platí:

$$\begin{aligned} |f(y) - f(x)| &\leq |f(y) - f(x_k)| + |f(x_k) - f(x)| \\ &\leq |f_k(y) - f_k(x_k)| + 2\|f - f_k\| + |f(x_k) - f(x)| \\ &\leq n|y - x_k| + 2\|f - f_k\| + |f(x_k) - f(x)| \\ &\rightarrow n|y - x|. \end{aligned}$$

Dostáváme  $|f(y) - f(x)| \leq n|y - x|$ , takže  $f \in S_n$ , a  $S_n$  je uzavřená.

Ad a)  $S_n$  je uzavřená.

$$S_n = \{f \in C[0, 1] : (\exists x \in [0, 1])(\forall y \in [0, 1]) |f(y) - f(x)| \leq n|y - x|\}$$

$S_n$  je uzavřená: Necht'  $f_k \in S_n$ ,  $f_k \rightarrow f$ . Najdeme  $x_k \in [0, 1]$ , že

$$(\forall y \in [0, 1]) |f_k(y) - f_k(x_k)| \leq n|y - x_k|.$$

BŮNO  $x_k \rightarrow x \in [0, 1]$ . Nyní pro libovolné  $y \in [0, 1]$  platí:

$$\begin{aligned} |f(y) - f(x)| &\leq |f(y) - f(x_k)| + |f(x_k) - f(x)| \\ &\leq |f_k(y) - f_k(x_k)| + 2\|f - f_k\| + |f(x_k) - f(x)| \\ &\leq n|y - x_k| + 2\|f - f_k\| + |f(x_k) - f(x)| \\ &\rightarrow n|y - x|. \end{aligned}$$

Dostáváme  $|f(y) - f(x)| \leq n|y - x|$ , takže  $f \in S_n$ , a  $S_n$  je uzavřená.

Ad b)  $C[0, 1] \setminus S_n$  je hustá.

$$S_n = \{f \in C[0, 1] : (\exists x \in [0, 1])(\forall y \in [0, 1]) |f(y) - f(x)| \leq n|y - x|\}$$

Nechť  $g \in C[0, 1]$  a  $0 < \varepsilon < 1$ . Máme ukázat  $B(g, \varepsilon) \setminus S_n \neq \emptyset$ .

Z kompaktnosti:  $g$  je **stejněměrně spojitá**, a tedy najdeme  $\delta > 0$ :

$$(\forall x, y \in [0, 1]) \quad |x - y| \leq \delta \Rightarrow |g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

Nyní zvolme  $k \in \mathbb{N}$ ,  $k > \max(1/\delta, 4n/\varepsilon)$  a definujme

$$f(x) = g(x) + \frac{\varepsilon}{2} \sin(2k\pi x). \quad (\text{Pak } f \in B(g, \varepsilon).)$$

Snadné: Pro libovolné  $x$  existuje  $y \in [0, 1]$ ,  $|y - x| \leq 1/k$ , že  $|\sin(2k\pi y) - \sin(2k\pi x)| = 1$ . Pak ale

$$|f(y) - f(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2} - |g(y) - g(x)| \geq \frac{\varepsilon}{4} > \frac{n}{k} \geq n|y - x|.$$

Tedy  $f \in B(g, \varepsilon) \setminus S_n$ , jak jsme chtěli.



Ad b)  $C[0, 1] \setminus S_n$  je hustá.

$$S_n = \{f \in C[0, 1] : (\exists x \in [0, 1])(\forall y \in [0, 1]) |f(y) - f(x)| \leq n|y - x|\}$$

Nechť  $g \in C[0, 1]$  a  $0 < \varepsilon < 1$ . Máme ukázat  $B(g, \varepsilon) \setminus S_n \neq \emptyset$ .

Z kompaktnosti:  $g$  je **stejněměrně spojitá**, a tedy najdeme  $\delta > 0$ :

$$(\forall x, y \in [0, 1]) \quad |x - y| \leq \delta \Rightarrow |g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

Nyní zvolme  $k \in \mathbb{N}$ ,  $k > \max(1/\delta, 4n/\varepsilon)$  a definujme

$$f(x) = g(x) + \frac{\varepsilon}{2} \sin(2k\pi x). \quad (\text{Pak } f \in B(g, \varepsilon).)$$

Snadné: Pro libovolné  $x$  existuje  $y \in [0, 1]$ ,  $|y - x| \leq 1/k$ , že  $|\sin(2k\pi y) - \sin(2k\pi x)| = 1$ . Pak ale

$$|f(y) - f(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2} - |g(y) - g(x)| \geq \frac{\varepsilon}{4} > \frac{n}{k} \geq n|y - x|.$$

Tedy  $f \in B(g, \varepsilon) \setminus S_n$ , jak jsme chtěli.



Ad b)  $C[0, 1] \setminus S_n$  je hustá.

$$S_n = \{f \in C[0, 1] : (\exists x \in [0, 1])(\forall y \in [0, 1]) |f(y) - f(x)| \leq n|y - x|\}$$

Nechť  $g \in C[0, 1]$  a  $0 < \varepsilon < 1$ . Máme ukázat  $B(g, \varepsilon) \setminus S_n \neq \emptyset$ .

Z kompaktnosti:  $g$  je **stejněměrně spojitá**, a tedy najdeme  $\delta > 0$ :

$$(\forall x, y \in [0, 1]) \quad |x - y| \leq \delta \Rightarrow |g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

Nyní zvolme  $k \in \mathbb{N}$ ,  $k > \max(1/\delta, 4n/\varepsilon)$  a definujme

$$f(x) = g(x) + \frac{\varepsilon}{2} \sin(2k\pi x). \quad (\text{Pak } f \in B(g, \varepsilon).)$$

Snadné: Pro libovolné  $x$  existuje  $y \in [0, 1]$ ,  $|y - x| \leq 1/k$ , že  $|\sin(2k\pi y) - \sin(2k\pi x)| = 1$ . Pak ale

$$|f(y) - f(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2} - |g(y) - g(x)| \geq \frac{\varepsilon}{4} > \frac{n}{k} \geq n|y - x|.$$

Tedy  $f \in B(g, \varepsilon) \setminus S_n$ , jak jsme chtěli.



Ad b)  $C[0, 1] \setminus S_n$  je hustá.

$$S_n = \{f \in C[0, 1] : (\exists x \in [0, 1])(\forall y \in [0, 1]) |f(y) - f(x)| \leq n|y - x|\}$$

Nechť  $g \in C[0, 1]$  a  $0 < \varepsilon < 1$ . Máme ukázat  $B(g, \varepsilon) \setminus S_n \neq \emptyset$ .

Z kompaktnosti:  $g$  je **stejněměrně spojitá**, a tedy najdeme  $\delta > 0$ :

$$(\forall x, y \in [0, 1]) \quad |x - y| \leq \delta \Rightarrow |g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

Nyní zvolme  $k \in \mathbb{N}$ ,  $k > \max(1/\delta, 4n/\varepsilon)$  a definujme

$$f(x) = g(x) + \frac{\varepsilon}{2} \sin(2k\pi x). \quad (\text{Pak } f \in B(g, \varepsilon).)$$

Snadné: Pro libovolné  $x$  existuje  $y \in [0, 1]$ ,  $|y - x| \leq 1/k$ , že  $|\sin(2k\pi y) - \sin(2k\pi x)| = 1$ . Pak ale

$$|f(y) - f(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2} - |g(y) - g(x)| \geq \frac{\varepsilon}{4} > \frac{n}{k} \geq n|y - x|.$$

Tedy  $f \in B(g, \varepsilon) \setminus S_n$ , jak jsme chtěli.

Ad b)  $C[0, 1] \setminus S_n$  je hustá.

$$S_n = \{f \in C[0, 1] : (\exists x \in [0, 1])(\forall y \in [0, 1]) |f(y) - f(x)| \leq n|y - x|\}$$

Nechť  $g \in C[0, 1]$  a  $0 < \varepsilon < 1$ . Máme ukázat  $B(g, \varepsilon) \setminus S_n \neq \emptyset$ .

Z kompaktnosti:  $g$  je **stejněměrně spojitá**, a tedy najdeme  $\delta > 0$ :

$$(\forall x, y \in [0, 1]) \quad |x - y| \leq \delta \Rightarrow |g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

Nyní zvolme  $k \in \mathbb{N}$ ,  $k > \max(1/\delta, 4n/\varepsilon)$  a definujme

$$f(x) = g(x) + \frac{\varepsilon}{2} \sin(2k\pi x). \quad (\text{Pak } f \in B(g, \varepsilon).)$$

Snadné: Pro libovolné  $x$  existuje  $y \in [0, 1]$ ,  $|y - x| \leq 1/k$ , že  $|\sin(2k\pi y) - \sin(2k\pi x)| = 1$ . Pak ale

$$|f(y) - f(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2} - |g(y) - g(x)| \geq \frac{\varepsilon}{4} > \frac{n}{k} \geq n|y - x|.$$

Tedy  $f \in B(g, \varepsilon) \setminus S_n$ , jak jsme chtěli.



Ad b)  $C[0, 1] \setminus S_n$  je hustá.

$$S_n = \{f \in C[0, 1] : (\exists x \in [0, 1])(\forall y \in [0, 1]) |f(y) - f(x)| \leq n|y - x|\}$$

Nechť  $g \in C[0, 1]$  a  $0 < \varepsilon < 1$ . Máme ukázat  $B(g, \varepsilon) \setminus S_n \neq \emptyset$ .

Z kompaktnosti:  $g$  je **stejněměrně spojitá**, a tedy najdeme  $\delta > 0$ :

$$(\forall x, y \in [0, 1]) \quad |x - y| \leq \delta \Rightarrow |g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

Nyní zvolme  $k \in \mathbb{N}$ ,  $k > \max(1/\delta, 4n/\varepsilon)$  a definujme

$$f(x) = g(x) + \frac{\varepsilon}{2} \sin(2k\pi x). \quad (\text{Pak } f \in B(g, \varepsilon).)$$

Snadné: Pro libovolné  $x$  existuje  $y \in [0, 1]$ ,  $|y - x| \leq 1/k$ , že  $|\sin(2k\pi y) - \sin(2k\pi x)| = 1$ . Pak ale

$$|f(y) - f(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2} - |g(y) - g(x)| \geq \frac{\varepsilon}{4} > \frac{n}{k} \geq n|y - x|.$$

Tedy  $f \in B(g, \varepsilon) \setminus S_n$ , jak jsme chtěli.

Ad b)  $C[0, 1] \setminus S_n$  je hustá.

$$S_n = \{f \in C[0, 1] : (\exists x \in [0, 1])(\forall y \in [0, 1]) |f(y) - f(x)| \leq n|y - x|\}$$

Nechť  $g \in C[0, 1]$  a  $0 < \varepsilon < 1$ . Máme ukázat  $B(g, \varepsilon) \setminus S_n \neq \emptyset$ .

Z kompaktnosti:  $g$  je **stejněměrně spojitá**, a tedy najdeme  $\delta > 0$ :

$$(\forall x, y \in [0, 1]) \quad |x - y| \leq \delta \Rightarrow |g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

Nyní zvolme  $k \in \mathbb{N}$ ,  $k > \max(1/\delta, 4n/\varepsilon)$  a definujme

$$f(x) = g(x) + \frac{\varepsilon}{2} \sin(2k\pi x). \quad (\text{Pak } f \in B(g, \varepsilon).)$$

Snadné: Pro libovolné  $x$  existuje  $y \in [0, 1]$ ,  $|y - x| \leq 1/k$ , že  $|\sin(2k\pi y) - \sin(2k\pi x)| = 1$ . Pak ale

$$|f(y) - f(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2} - |g(y) - g(x)| \geq \frac{\varepsilon}{4} > \frac{n}{k} \geq n|y - x|.$$

Tedy  $f \in B(g, \varepsilon) \setminus S_n$ , jak jsme chtěli.

Ad c)  $f'(x)$  existuje  $\Rightarrow f \in S_n$  pro nějaké  $n$ .

Nechť ex.  $f'(x)$ . Najdi  $\delta > 0$  tak, že  $\left| \frac{f(y)-f(x)}{x-y} - f'(x) \right| < 1$ ,  
kdykoliv  $0 < |y - x| < \delta$ .

Zvolme  $n \geq \max(1 + |f'(x)|, \frac{2\|f\|}{\delta})$ . Pro  $y \in [0, 1]$  ukážeme

$$|f(y) - f(x)| \leq n|y - x|.$$

To je jasné pro  $y = x$ . Pro  $0 < |y - x| < \delta$  máme

$$\begin{aligned} |f(y) - f(x)| &\leq |y - x| \cdot \left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} - f'(x) \right| + |y - x| \cdot |f'(x)| \\ &\leq (1 + |f'(x)|) |y - x| \leq n|y - x|. \end{aligned}$$

Pokud naopak  $|y - x| \geq \delta$ , potom

$$|f(y) - f(x)| \leq 2\|f\| = \frac{2\|f\|}{\delta} \delta \leq \frac{2\|f\|}{\delta} |y - x| \leq n|y - x|. \quad \square$$

Ad c)  $f'(x)$  existuje  $\Rightarrow f \in S_n$  pro nějaké  $n$ .

Nechť ex.  $f'(x)$ . Najdi  $\delta > 0$  tak, že  $\left| \frac{f(y)-f(x)}{x-y} - f'(x) \right| < 1$ ,  
kdykoliv  $0 < |y - x| < \delta$ .

Zvolme  $n \geq \max(1 + |f'(x)|, \frac{2\|f\|}{\delta})$ . Pro  $y \in [0, 1]$  ukážeme

$$|f(y) - f(x)| \leq n|y - x|.$$

To je jasné pro  $y = x$ . Pro  $0 < |y - x| < \delta$  máme

$$\begin{aligned} |f(y) - f(x)| &\leq |y - x| \cdot \left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} - f'(x) \right| + |y - x| \cdot |f'(x)| \\ &\leq (1 + |f'(x)|) |y - x| \leq n|y - x|. \end{aligned}$$

Pokud naopak  $|y - x| \geq \delta$ , potom

$$|f(y) - f(x)| \leq 2\|f\| = \frac{2\|f\|}{\delta} \delta \leq \frac{2\|f\|}{\delta} |y - x| \leq n|y - x|. \quad \square$$

Ad c)  $f'(x)$  existuje  $\Rightarrow f \in S_n$  pro nějaké  $n$ .

Nechť ex.  $f'(x)$ . Najdi  $\delta > 0$  tak, že  $\left| \frac{f(y)-f(x)}{x-y} - f'(x) \right| < 1$ ,  
kdykoliv  $0 < |y - x| < \delta$ .

Zvolme  $n \geq \max(1 + |f'(x)|, \frac{2\|f\|}{\delta})$ . Pro  $y \in [0, 1]$  ukážeme

$$|f(y) - f(x)| \leq n|y - x|.$$

To je jasné pro  $y = x$ . Pro  $0 < |y - x| < \delta$  máme

$$\begin{aligned} |f(y) - f(x)| &\leq |y - x| \cdot \left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} - f'(x) \right| + |y - x| \cdot |f'(x)| \\ &\leq (1 + |f'(x)|) |y - x| \leq n|y - x|. \end{aligned}$$

Pokud naopak  $|y - x| \geq \delta$ , potom

$$|f(y) - f(x)| \leq 2\|f\| = \frac{2\|f\|}{\delta} \delta \leq \frac{2\|f\|}{\delta} |y - x| \leq n|y - x|. \quad \square$$

Ad c)  $f'(x)$  existuje  $\Rightarrow f \in S_n$  pro nějaké  $n$ .

Nechť ex.  $f'(x)$ . Najdi  $\delta > 0$  tak, že  $\left| \frac{f(y)-f(x)}{x-y} - f'(x) \right| < 1$ ,  
kdykoliv  $0 < |y - x| < \delta$ .

Zvolme  $n \geq \max(1 + |f'(x)|, \frac{2\|f\|}{\delta})$ . Pro  $y \in [0, 1]$  ukážeme

$$|f(y) - f(x)| \leq n|y - x|.$$

To je jasné pro  $y = x$ . Pro  $0 < |y - x| < \delta$  máme

$$\begin{aligned} |f(y) - f(x)| &\leq |y - x| \cdot \left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} - f'(x) \right| + |y - x| \cdot |f'(x)| \\ &\leq (1 + |f'(x)|) |y - x| \leq n|y - x|. \end{aligned}$$

Pokud naopak  $|y - x| \geq \delta$ , potom

$$|f(y) - f(x)| \leq 2\|f\| = \frac{2\|f\|}{\delta} \delta \leq \frac{2\|f\|}{\delta} |y - x| \leq n|y - x|. \quad \square$$

Ad c)  $f'(x)$  existuje  $\Rightarrow f \in S_n$  pro nějaké  $n$ .

Nechť ex.  $f'(x)$ . Najdi  $\delta > 0$  tak, že  $\left| \frac{f(y)-f(x)}{x-y} - f'(x) \right| < 1$ ,  
kdykoliv  $0 < |y - x| < \delta$ .

Zvolme  $n \geq \max(1 + |f'(x)|, \frac{2\|f\|}{\delta})$ . Pro  $y \in [0, 1]$  ukážeme

$$|f(y) - f(x)| \leq n|y - x|.$$

To je jasné pro  $y = x$ . Pro  $0 < |y - x| < \delta$  máme

$$\begin{aligned} |f(y) - f(x)| &\leq |y - x| \cdot \left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} - f'(x) \right| + |y - x| \cdot |f'(x)| \\ &\leq (1 + |f'(x)|) |y - x| \leq n|y - x|. \end{aligned}$$

Pokud naopak  $|y - x| \geq \delta$ , potom

$$|f(y) - f(x)| \leq 2\|f\| = \frac{2\|f\|}{\delta} \delta \leq \frac{2\|f\|}{\delta} |y - x| \leq n|y - x|. \quad \square$$

Ad c)  $f'(x)$  existuje  $\Rightarrow f \in S_n$  pro nějaké  $n$ .

Nechť ex.  $f'(x)$ . Najdi  $\delta > 0$  tak, že  $\left| \frac{f(y)-f(x)}{x-y} - f'(x) \right| < 1$ ,  
kdykoliv  $0 < |y - x| < \delta$ .

Zvolme  $n \geq \max(1 + |f'(x)|, \frac{2\|f\|}{\delta})$ . Pro  $y \in [0, 1]$  ukážeme

$$|f(y) - f(x)| \leq n|y - x|.$$

To je jasné pro  $y = x$ . Pro  $0 < |y - x| < \delta$  máme

$$\begin{aligned} |f(y) - f(x)| &\leq |y - x| \cdot \left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} - f'(x) \right| + |y - x| \cdot |f'(x)| \\ &\leq (1 + |f'(x)|) |y - x| \leq n|y - x|. \end{aligned}$$

Pokud naopak  $|y - x| \geq \delta$ , potom

$$|f(y) - f(x)| \leq 2\|f\| = \frac{2\|f\|}{\delta} \delta \leq \frac{2\|f\|}{\delta} |y - x| \leq n|y - x|. \quad \square$$

# Diferencovatelné monstrum

Těž známé jako köpckeovská funkce.

## Definice

Funkce  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  se nazve **diferencovatelné monstrum**, pokud má ve všech bodech vlastní derivaci a není na žádném intervalu monotónní.

Fakt: Je-li  $f$  diferencovatelné monstrum, pak

- Množiny  $\{x: f'(x) > 0\}$  a  $\{x: f'(x) < 0\}$  jsou obě husté.
- $f'$  není v žádném bodě spojitá.

Existenci dif. monstra lze dokázat pomocí Baireovy věty podobně, jako jsme to provedli pro (běžné) monstrum. (Clifford Weil)

Je ovšem potřeba pracovat v jistém úplném **podprostoru**  $C[0, 1]$ .

# Diferencovatelné monstrum

Těž známé jako köpckeovská funkce.

## Definice

Funkce  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  se nazve **diferencovatelné monstrum**, pokud má ve všech bodech vlastní derivaci a není na žádném intervalu monotónní.

Fakt: Je-li  $f$  diferencovatelné monstrum, pak

- Množiny  $\{x: f'(x) > 0\}$  a  $\{x: f'(x) < 0\}$  jsou obě husté.
- $f'$  není v žádném bodě spojitá.

Existenci dif. monstra lze dokázat pomocí Baireovy věty podobně, jako jsme to provedli pro (běžné) monstrum. (Clifford Weil)

Je ovšem potřeba pracovat v jistém úplném **podprostoru**  $C[0, 1]$ .

# Diferencovatelné monstrum

Těž známé jako köpckeovská funkce.

## Definice

Funkce  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  se nazve **diferencovatelné monstrum**, pokud má ve všech bodech vlastní derivaci a není na žádném intervalu monotónní.

Fakt: Je-li  $f$  diferencovatelné monstrum, pak

- Množiny  $\{x: f'(x) > 0\}$  a  $\{x: f'(x) < 0\}$  jsou obě husté.
- $f'$  není v žádném bodě spojitá.

Existenci dif. monstra lze dokázat pomocí Baireovy věty podobně, jako jsme to provedli pro (běžné) monstrum. (Clifford Weil)

Je ovšem potřeba pracovat v jistém úplném **podprostoru**  $C[0, 1]$ .

# Diferencovatelné monstrum

Těž známé jako köpckeovská funkce.

## Definice

Funkce  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  se nazve **diferencovatelné monstrum**, pokud má ve všech bodech vlastní derivaci a není na žádném intervalu monotónní.

Fakt: Je-li  $f$  diferencovatelné monstrum, pak

- Množiny  $\{x: f'(x) > 0\}$  a  $\{x: f'(x) < 0\}$  jsou obě husté.
- $f'$  není v žádném bodě spojitá.

Existenci dif. monstra lze dokázat pomocí Baireovy věty podobně, jako jsme to provedli pro (běžné) monstrum. (Clifford Weil)

Je ovšem potřeba pracovat v jistém úplném **podprostoru**  $C[0, 1]$ .

# Diferencovatelné monstrum

Těž známé jako köpckeovská funkce.

## Definice

Funkce  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  se nazve **diferencovatelné monstrum**, pokud má ve všech bodech vlastní derivaci a není na žádném intervalu monotónní.

Fakt: Je-li  $f$  diferencovatelné monstrum, pak

- Množiny  $\{x: f'(x) > 0\}$  a  $\{x: f'(x) < 0\}$  jsou obě husté.
- $f'$  není v žádném bodě spojitá.

Existenci dif. monstra lze dokázat pomocí Baireovy věty podobně, jako jsme to provedli pro (běžné) monstrum. (Clifford Weil)

Je ovšem potřeba pracovat v jistém úplném **podprostoru**  $C[0, 1]$ .

# Diferencovatelné monstrum

Těž známé jako köpckeovská funkce.

## Definice

Funkce  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  se nazve **diferencovatelné monstrum**, pokud má ve všech bodech vlastní derivaci a není na žádném intervalu monotónní.

Fakt: Je-li  $f$  diferencovatelné monstrum, pak

- Množiny  $\{x: f'(x) > 0\}$  a  $\{x: f'(x) < 0\}$  jsou obě husté.
- $f'$  není v žádném bodě spojitá.

Existenci dif. monstra lze dokázat pomocí Baireovy věty podobně, jako jsme to provedli pro (běžné) monstrum. (Clifford Weil)

Je ovšem potřeba pracovat v jistém úplném **podprostoru**  $C[0, 1]$ .

# Diferencovatelné monstrum

Těž známé jako köpckeovská funkce.

## Definice

Funkce  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  se nazve **diferencovatelné monstrum**, pokud má ve všech bodech vlastní derivaci a není na žádném intervalu monotónní.

Fakt: Je-li  $f$  diferencovatelné monstrum, pak

- Množiny  $\{x: f'(x) > 0\}$  a  $\{x: f'(x) < 0\}$  jsou obě husté.
- $f'$  není v žádném bodě spojitá.

Existenci dif. monstra lze dokázat pomocí Baireovy věty podobně, jako jsme to provedli pro (běžné) monstrum. (Clifford Weil)

Je ovšem potřeba pracovat v jistém úplném **podprostoru**  $C[0, 1]$ .

**Děkuji za pozornost!**



# Osnova

1 Průlet historií kalkulu

2 Monstra

3 Bonus

# Pompeiova funkce (1906)

## Definice

$$\mathcal{P}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cdot (x - a_n)^{\frac{1}{3}},$$

kde  $A_n > 0$  ( $n \in \mathbb{N}$ ),  $\sum_{n=1}^{\infty} A_n < \infty$  a  $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$  je spočetná hustá v intervalu  $[0, 1]$ .

Pak  $\mathcal{P}$  je rostoucí a diferencovatelná se zdola omezenou derivací. Navíc  $\forall n \in \mathbb{N} : \mathcal{P}'(a_n) = \infty$ .

Snadno se odvodí:  $p := \mathcal{P}^{-1}$  je rostoucí, diferencovatelná, má omezenou derivaci a na husté množině má derivaci 0.

BÚNO  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .

# Pompeiova funkce (1906)

## Definice

$$\mathcal{P}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cdot (x - a_n)^{\frac{1}{3}},$$

kde  $A_n > 0$  ( $n \in \mathbb{N}$ ),  $\sum_{n=1}^{\infty} A_n < \infty$  a  $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$  je spočetná hustá v intervalu  $[0, 1]$ .

Pak  $\mathcal{P}$  je rostoucí a diferencovatelná se zdola omezenou derivací.  
Navíc  $\forall n \in \mathbb{N} : \mathcal{P}'(a_n) = \infty$ .

Snadno se odvodí:  $p := \mathcal{P}^{-1}$  je rostoucí, diferencovatelná, má omezenou derivaci a na husté množině má derivaci 0.

BÚNO  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .

# Pompeiova funkce (1906)

## Definice

$$\mathcal{P}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cdot (x - a_n)^{\frac{1}{3}},$$

kde  $A_n > 0$  ( $n \in \mathbb{N}$ ),  $\sum_{n=1}^{\infty} A_n < \infty$  a  $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$  je spočetná hustá v intervalu  $[0, 1]$ .

Pak  $\mathcal{P}$  je rostoucí a diferencovatelná se zdola omezenou derivací. Navíc  $\forall n \in \mathbb{N} : \mathcal{P}'(a_n) = \infty$ .

Snadno se odvodí:  $p := \mathcal{P}^{-1}$  je rostoucí, diferencovatelná, má omezenou derivaci a na husté množině má derivaci 0.

BÚNO  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .

# Pompeiova funkce (1906)

## Definice

$$\mathcal{P}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cdot (x - a_n)^{\frac{1}{3}},$$

kde  $A_n > 0$  ( $n \in \mathbb{N}$ ),  $\sum_{n=1}^{\infty} A_n < \infty$  a  $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$  je spočetná hustá v intervalu  $[0, 1]$ .

Pak  $\mathcal{P}$  je rostoucí a diferencovatelná se zdola omezenou derivací. Navíc  $\forall n \in \mathbb{N} : \mathcal{P}'(a_n) = \infty$ .

Snadno se odvodí:  $p := \mathcal{P}^{-1}$  je rostoucí, diferencovatelná, má omezenou derivaci a na husté množině má derivaci 0.

BÚNO  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .

# Pompeiova funkce (1906)

## Definice

$$\mathcal{P}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cdot (x - a_n)^{\frac{1}{3}},$$

kde  $A_n > 0$  ( $n \in \mathbb{N}$ ),  $\sum_{n=1}^{\infty} A_n < \infty$  a  $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$  je spočetná hustá v intervalu  $[0, 1]$ .

Pak  $\mathcal{P}$  je rostoucí a diferencovatelná se zdola omezenou derivací. Navíc  $\forall n \in \mathbb{N} : \mathcal{P}'(a_n) = \infty$ .

Snadno se odvodí:  $p := \mathcal{P}^{-1}$  je rostoucí, diferencovatelná, má omezenou derivaci a na husté množině má derivaci 0.

**BÚNO**  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .

# Prostory derivací

Definujme následující množiny funkcí:

$$D := \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}: f \text{ omez. a má PF na } \mathbb{R}\};$$

$$D_0 := \{f \in D: \{x: f(x) = 0\} \text{ je hustá v } \mathbb{R}\}.$$

- Metrika  $\rho_\infty(f, g) = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - g(x)|$  dělá z  $D$  úplný MP.
- $D_0 \subseteq D$  je uzavřená podmnožina. Proto i  $(D_0, \rho_\infty)$  je úplný.
- Navíc  $D_0 \neq \{0\}$ , protože  $p \in D_0$ , kde  $p = \mathcal{P}^{-1}$ .
- $D_0$  je vektorový prostor (uz. na sčítání a násobení skalárem).

# Prostory derivací

Definujme následující množiny funkcí:

$$D := \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}: f \text{ omez. a má PF na } \mathbb{R}\};$$

$$D_0 := \{f \in D: \{x: f(x) = 0\} \text{ je hustá v } \mathbb{R}\}.$$

- Metrika  $\rho_\infty(f, g) = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - g(x)|$  dělá z  $D$  úplný MP.
- $D_0 \subseteq D$  je uzavřená podmnožina. Proto i  $(D_0, \rho_\infty)$  je úplný.
- Navíc  $D_0 \neq \{0\}$ , protože  $p \in D_0$ , kde  $p = \mathcal{P}^{-1}$ .
- $D_0$  je vektorový prostor (uz. na sčítání a násobení skalárem).

# Prostory derivací

Definujme následující množiny funkcí:

$$D := \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}: f \text{ omez. a má PF na } \mathbb{R}\};$$

$$D_0 := \{f \in D: \{x: f(x) = 0\} \text{ je hustá v } \mathbb{R}\}.$$

- Metrika  $\rho_\infty(f, g) = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - g(x)|$  dělá z  $D$  úplný MP.
- $D_0 \subseteq D$  je uzavřená podmnožina. Proto i  $(D_0, \rho_\infty)$  je úplný.
- Navíc  $D_0 \neq \{0\}$ , protože  $p \in D_0$ , kde  $p = \mathcal{P}^{-1}$ .
- $D_0$  je vektorový prostor (uz. na sčítání a násobení skalárem).

# Prostory derivací

Definujme následující množiny funkcí:

$$D := \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}: f \text{ omez. a má PF na } \mathbb{R}\};$$

$$D_0 := \{f \in D: \{x: f(x) = 0\} \text{ je hustá v } \mathbb{R}\}.$$

- Metrika  $\rho_\infty(f, g) = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - g(x)|$  dělá z  $D$  úplný MP.
- $D_0 \subseteq D$  je uzavřená podmnožina. Proto i  $(D_0, \rho_\infty)$  je úplný.
- Navíc  $D_0 \neq \{0\}$ , protože  $p \in D_0$ , kde  $p = \mathcal{P}^{-1}$ .
- $D_0$  je vektorový prostor (uz. na sčítání a násobení skalárem).

# Prostory derivací

Definujme následující množiny funkcí:

$$D := \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}: f \text{ omez. a má PF na } \mathbb{R}\};$$

$$D_0 := \{f \in D: \{x: f(x) = 0\} \text{ je hustá v } \mathbb{R}\}.$$

- Metrika  $\rho_\infty(f, g) = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - g(x)|$  dělá z  $D$  úplný MP.
- $D_0 \subseteq D$  je uzavřená podmnožina. Proto i  $(D_0, \rho_\infty)$  je úplný.
- Navíc  $D_0 \neq \{0\}$ , protože  $p \in D_0$ , kde  $p = \mathcal{P}^{-1}$ .
- $D_0$  je vektorový prostor (uz. na sčítání a násobení skalárem).

# Prostory derivací

Definujme následující množiny funkcí:

$$D := \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}: f \text{ omez. a má PF na } \mathbb{R}\};$$

$$D_0 := \{f \in D: \{x: f(x) = 0\} \text{ je hustá v } \mathbb{R}\}.$$

- Metrika  $\rho_\infty(f, g) = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - g(x)|$  dělá z  $D$  úplný MP.
- $D_0 \subseteq D$  je uzavřená podmnožina. Proto i  $(D_0, \rho_\infty)$  je úplný.
- Navíc  $D_0 \neq \{0\}$ , protože  $p \in D_0$ , kde  $p = \mathcal{P}^{-1}$ .
- $D_0$  je vektorový prostor (uz. na sčítání a násobení skalárem).

# Diferencovatelné monstrum existuje

## Věta (Clifford Weil (1976))

*Nechť  $E = \{f \in D_0 : \exists I \subseteq \mathbb{R} \text{ interval: } f \text{ nemění zn. na } I\}$ .*

*Pak  $E$  je první kategorie v  $D_0$ , a tedy  $D_0 \setminus E \neq \emptyset$ . Libovolný prvek  $D_0 \setminus E$  je diferencovatelné monstrum.*

Bud'  $\{I_n\}$  posloupnost všech intervalů  $I_n = (a_n, b_n)$ ,  $a_n, b_n \in \mathbb{Q}$ .  
Položme

$$E_n := \{f \in D_0 : f \geq 0 \text{ na } I_n\}, \quad F_n := \{f \in D_0 : f \leq 0 \text{ na } I_n\}.$$

Stačí ukázat, že  $E_n, F_n$  jsou řídké.

# Diferencovatelné monstrum existuje

## Věta (Clifford Weil (1976))

*Nechť  $E = \{f \in D_0 : \exists I \subseteq \mathbb{R} \text{ interval} : f \text{ nemění zn. na } I\}$ .*

*Pak  $E$  je první kategorie v  $D_0$ , a tedy  $D_0 \setminus E \neq \emptyset$ . Libovolný prvek  $D_0 \setminus E$  je diferencovatelné monstrum.*

Bud'  $\{I_n\}$  posloupnost všech intervalů  $I_n = (a_n, b_n)$ ,  $a_n, b_n \in \mathbb{Q}$ .  
Položme

$$E_n := \{f \in D_0 : f \geq 0 \text{ na } I_n\}, \quad F_n := \{f \in D_0 : f \leq 0 \text{ na } I_n\}.$$

Stačí ukázat, že  $E_n, F_n$  jsou řídké.

# Diferencovatelné monstrum existuje

## Věta (Clifford Weil (1976))

*Nechť  $E = \{f \in D_0 : \exists I \subseteq \mathbb{R} \text{ interval: } f \text{ nemění zn. na } I\}$ .*

*Pak  $E$  je první kategorie v  $D_0$ , a tedy  $D_0 \setminus E \neq \emptyset$ . Libovolný prvek  $D_0 \setminus E$  je diferencovatelné monstrum.*

Bud'  $\{I_n\}$  posloupnost všech intervalů  $I_n = (a_n, b_n)$ ,  $a_n, b_n \in \mathbb{Q}$ .  
Položme

$$E_n := \{f \in D_0 : f \geq 0 \text{ na } I_n\}, \quad F_n := \{f \in D_0 : f \leq 0 \text{ na } I_n\}.$$

Stačí ukázat, že  $E_n, F_n$  jsou řídké.

# Diferencovatelné monstrum existuje

## Věta (Clifford Weil (1976))

*Nechť  $E = \{f \in D_0 : \exists I \subseteq \mathbb{R} \text{ interval: } f \text{ nemění zn. na } I\}$ .*

*Pak  $E$  je první kategorie v  $D_0$ , a tedy  $D_0 \setminus E \neq \emptyset$ . Libovolný prvek  $D_0 \setminus E$  je diferencovatelné monstrum.*

Bud'  $\{I_n\}$  posloupnost všech intervalů  $I_n = (a_n, b_n)$ ,  $a_n, b_n \in \mathbb{Q}$ .  
Položme

$$E_n := \{f \in D_0 : f \geq 0 \text{ na } I_n\}, \quad F_n := \{f \in D_0 : f \leq 0 \text{ na } I_n\}.$$

Stačí ukázat, že  $E_n, F_n$  jsou řídké.